祕傳證治要訣

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

秘傳證治要訣

戴元禮述

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

祕傳證治要訣卷之一

明　大醫院使　戴元禮述

諸中門

中風附破傷風漏風

天地間惟風無所不入。一罅不塞。來不可禦。人之一身。縝密者少。踈漏者多。風乘之也。輕則爲感。重則爲傷。又重則爲中。古人謂避風如避寇。蓋欲窒源以防患。中風之證。卒然暈倒。昏不知人。或痰涎壅盛。咽喉作聲。或口眼喎斜。手足癱緩。或半身不遂。或舌強不語。風邪既盛。氣必上逆。痰隨氣上。停留壅塞。昏亂暈倒。皆痰爲之也。五臟雖皆有風。而犯肝經爲多。蓋肝主筋屬木。風易入之。各從其類。肝受風則筋緩不榮。或緩或急。所以有喎斜、癱緩、不遂、舌強、語澁等証。治之之法。調氣爲先。經云。善治風者以氣理風。氣順則痰消。徐理其風。庶可收效。先用麻油調蘇合香圓。或用姜汁。或用白湯調。如口噤抉開灌之。稍甦。則進八味順氣散。

諸中。或未甦。或已甦。或初病。或久病。忽吐出紫紅色者死。昏沉不省人事。口噤不可進藥。急以生半夏爲末。吹入鼻中。或用細辛皁角爲末。吹入喉。噴嚏則甦。此可以驗其受病深淺。則知其可治不可治。若稍得

甦省者。八味順氣散便服治風藥。然未遽絕治氣藥。小續命湯煎熟去滓。調蘇合香圓一粒。或五積散加麝香少許。或星香散。或醒風湯加木香一錢。如服前藥不效。其人頑涎愈盛。或前證不解。或增困重。宜星附湯。或三生飲加全蝎三箇。間磨沉香湯下養正丹。肥人多有中病。以其氣盛於外而歉於內也。肺爲氣出入之道。人肥者氣必急。氣急必肺邪盛。肺金剋木。膽爲肝之腑。故痰涎壅盛。所以治之必先理氣爲急。中後氣未盡順。痰未盡除。調理之劑。惟當以藿香正氣散。星香散煎服。此藥非特可治中風之證。治中氣中惡霍亂尤宜。尋常上嘔下瀉多痰者。亦可用之。

若中後體虛有痰。不可峻補。熱燥者宜四君子湯和星香飲。或六君子湯和之。中而口眼喎斜者。先燒皁角烟薰之。以逐去外邪。次燒乳香薰之。以順其血脉。若前證多怒。宜小續命湯加羚羊角。熱而渴者。小續命湯去附子加秦艽半錢。恍惚錯語者。加茯神遠志各半錢。不得睡者。加炒酸棗仁半錢。不能言者加竹瀝一蜆殼許。人虛無力者。去麻黃加茯苓如其數。

若人自甦者。能言能食。惟身體不遂。急則攣蹉緩則躭曳。經年累月。難以起止。加減地仙丹常服。

若中飲食坐臥如常。但失音不語。俗呼爲啞風。小續命湯去附子加石菖蒲一錢。

筋骨疼者。俗呼爲痛風。或痛而遊走無定。俗呼爲走注風。並宜烏藥順氣散。和煎復元通氣散。嚥地仙丹。或青龍圓。未效。用大防風湯。或五積散調乳香末。

脛細而膝腫者。俗呼爲鶴膝風。宜地仙丹。

感冒後四逆手足不遂牙關緊急與霍亂後四逆手足搐捻欲成風者草果飲和星香散各半貼煎服。有無故口眼喎斜。投以中風藥劑不效。蓋緣骨虛中受風所致。當於此求之。不可例作尋常中風治之。川烏一味。決不可少。宜炮熟用。

遍身骨節疼痛。晝靜夜劇。如虎之嚙。名曰白虎歷節風。並宜加減地仙丹。或青龍圓乳香圓等。

有於窗隔間梳洗。卒然如中。呼爲瘖風。五積散加防風一錢。有痛風而痛有常處。其痛處赤腫灼熱。或渾身壯熱。此欲成風毒。宜敗毒散。

兩頰赤腫。其狀如痺。名頭面風。酒調消風散食後服。仍以生杏仁去殼頻揩之。諸般頭風。見在諸痛門。頭痛證。病有終身不愈者。其在腰或屈而不能伸。或伸不能屈者。在手足亦然。以風傷肝。肝主筋。筋爲之也。治法活血爲先。多服四物湯吞活絡丹。

治風之法。初得之。卽當順氣。及其久也。卽當活血。此萬古不易之理。久患風疾。四物湯吞活絡丹愈者。正是此義。若先不順氣。遽用烏附。又不活血。徒用防風天麻羌活輩。吾未見能治也。

風有偏枯。風痱。風懿。風痹。此皆言其至重也。外有證狀不同。其名亦衆。非旦暮可愈。非口耳可受。不復繁引。若中人髮直。吐清沫。搖頭。上攩。面赤如粧。汗綴如珠。或頭面赤黑。眼閉口開。手撒遺尿。聲如鼾睡。皆不可治。所謂風中脉則口眼喎斜。中腑則支體廢。中臟則性命危。不特中風。他中亦然。

其有害大風者。古謂之癩風。俗呼爲麻風病之至惡。無出於此。得此病而眉髮髭鬚先落。猶風撼木而葉

先落也。間有食蛇服大風油而愈者亦幸耳。

破傷風者。因皮肉曾有破傷處。風從瘡口入。其證項強牙關緊。狀如發痙。不似中風。又似產後角弓反張。用蘇合香圓。進防風散。玉眞圓。

漏風不論冬夏。額上常有汗出。得之醉後當風所致。頭乃諸陽之會。酒能發陽。所以飲必見面醉後陽氣上升。頭面之毛竅必開。當風坐臥。風邪入之。以致頭面汗名曰漏風。黃耆六一湯加防風麻黃根桂枝各半錢。風已除。只口開喎斜未正者。以草麻去殼爛搗。右喎塗在左。左喎塗在右。或以膳魚血入麝香少許塗之也。

有虛熱生風。元氣虛。虛則風乘之。治虛當兼風治。有虛證似風。此權當治其虛。不可以風論。

中風而疼痛甚者。或在遍身。或在手足。惟鐵彈圓佳。如碧霞丹。青州白圓子。防風圓。犀角圓。八風散。骨碎補圓。烏荊圓。大三五七散。四生散。省風湯。五痹湯。四生圓。輕腳圓。伏虎丹。祕方換腿圓。左經圓。木瓜圓。胡麻散。皆治諸中風。斟酌病源。當用治效方藥。

中氣

中氣、因七情內傷。氣逆爲病。痰潮昏塞。牙關緊急。但七情皆能使人中。因怒而中尤多。中氣之狀。大略與中風同。風與氣亦自難辨。以氣藥治風則可。以風藥治氣則不可。纔覺中氣。急以蘇合香圓灌之。候醒繼以八味順氣散。或調氣散。中氣與中風相似。所以別者。風中身温。氣中身冷。既甦之後。尚有餘痰未盡平

復宜多進四七湯及星香散若其人本虛痰氣上逆關膈不通上下不升降或大便虛閉宜用三和丹諸氣皆可用不獨中氣

中寒

中寒之證人身體強直口噤不語或四肢戰掉或洒洒惡寒或翕翕發熱或卒然眩暈身無汗者此爲寒毒所中宜先用酒調蘇合香圓輕則進五積散加香附一錢麝香少許重則用薑附湯若人漸甦身體回暖稍能言語須臾問其別有何證挾氣攻刺薑附湯加木香半錢挾氣不仁加防風一錢挾濕而腫痛者加白朮一錢筋脉牽急者加木瓜一錢肢節疼痛者加桂二錢

中暑

中暑爲證面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉或喘或滿切不可以冷水及用十分冷劑卻暑散水調灌下亦得或以來復丹末同蘇合香圓用湯調灌或以來復丹研末湯調灌之候其人稍甦則用香薷飲香薷湯煎熟去滓入麝香少許服或剉蒜肉入鼻中或研蒜水解灌之蓋中傷暑毒陽外陰內諸暑藥多有煖劑如大順散之用薑桂枇杷葉散之用丁香香薷飲之用香薷香薷味辛性暖蒜亦辛暖又蒜氣臭烈能通諸竅大概極臭極香之物皆能通竅故也

初覺中暑即以日晒瓦或布醮熱湯更易熨其心腹臍下急以二氣丹末湯調灌下

曾有客人中暑迷悶四肢厥逆冷汗如雨躶形欲投水中口吻涎沫流溢此中暑已深陰陽離絕難除

又有暑途一證。似中而輕。欲睡懶語。實人香薷飲加黃連一錢。虛人星香飲加香薷一錢。甦後冷汗不止。手足尚逆。煩悶多渴者。宜香薷飲。甦後爲醫者過投冷劑。致吐利不止。外熱內寒。煩躁多渴。甚欲躶形。狀如傷寒。陰盛隔陽。當用溫藥。香薷飲加附子浸冷服。渴者縮脾飲加附子亦浸冷服。

中濕

風寒暑濕。皆能中人。惟濕氣積久。留滯關節。故能中。非如風寒暑之有暴中也。中濕之證。關節痛重浮腫喘滿。腹脹煩悶。昏不知人。宜白朮酒。有破傷處。因澡浴濕氣從瘡口中入。其人昏迷沉重。狀類中濕。名曰破傷。宜白朮酒。

中惡

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。昏不知人。卽此是卒厥。客忤、飛尸、鬼擊、吊死、問喪、入廟登塚、多有此病。蘇合香圓灌之。候稍甦。以調氣散和平胃散服。名調脉平胃散。

霍亂之病。揮霍變亂。起於倉卒。與中惡相似。俗呼爲觸惡。但有吐利爲異耳。其證胸痞腹疼。氣不升降。甚則手足厥逆。冷汗自出。或吐而不瀉。或瀉而不吐。或兼作吐瀉。或吐瀉不透。且蘇合香圓以通其痞塞。繼進藿香正氣散加木香半錢。仍以蘇合香圓調苓來復丹。若果瀉已甚。則不可用來復丹。瀉而不吐。胸膈痞滿。先以陰陽湯。或濃鹽湯。頓服以導其吐。已吐未吐。並藿香正氣散。間進蘇合香圓。吐而不瀉。心腹疼

痛。頻欲登圊。苦於不通。藿香正氣散加枳殼一錢。多下來復丹。欲捷則用生枳殼。若不能見效。逼迫已甚。其勢不容不用神保圓。但神保雖能通利。亦入大腸而復有功。若膈於上而不能下。轉服轉祕。須用來復丹研末。湯調吞下養正丹百粒。庶可引前藥到下。吐瀉兼作。心腹纏擾未安者。藿香正氣散加官桂木香各半錢。不愈則投四順湯。

吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或水粒不入。或口渴喜冷。或惡寒戰掉。手足冷逆。或發熱煩躁。欲去衣被。此蓋內虛陰盛。卻不可以其喜冷欲去衣被爲熱。宜理中湯。甚則附子理中湯。不效。則四逆湯並宜放十分冷服。

欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹纏擾。痛不可忍。上下不通。言語不定。如見鬼神。俗謂之乾霍亂。先以濃鹽湯頓服。次調蘇合香圓。吞下來復丹。仍進藿香正氣散加木香枳殼各半錢。近世俗醫謂之捲腸沙。多信之。殊不知卽是霍亂。僥倖而愈者。一通之功耳。

霍亂轉筋。理中湯加凍膠剉炒一錢。仍令其繫縛腿脛。若筋入腹。及通身轉筋者不可治。筋轉者以造麵蔘汁暖熱浸。或用濃鹽湯浸。

霍亂已透。而餘吐餘瀉未止。腹有餘痛。宜一味報秋荳葉煎服。乾者尤佳。

霍亂之後。陽氣已脫。或遺尿而不知。或氣少而不語。或膏汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。皆不可治。

霍亂幷諸吐瀉後。胸膈高起。痞塞欲絕。理中湯加枳實半錢。茯苓半錢。名枳實理中湯。吐瀉已愈。而力怯

精神未復者十補飲。

夏天感暑。吐瀉如霍亂者。六和湯、香薷湯。皆是要藥。大吐瀉復厥逆躁擾。審之因暑得之。止宜香薷飲。人於夏月多食瓜菓。及飲冷乘風。以致食留不化。因食成痞。膈絕上下。遂成霍亂。六和湯倍藿香煎熟調蘇合香圓。

厥

厥者、逆也。手足逆冷也。其證不一。散之方書者甚多。今始撮其大概。寒熱厥逆。見諸傷門風寒證。尸厥、卽飛尸、卒厥、本門中惡證。蚘厥、見嘔吐門吐蚘證。痰厥、飲厥、見嘔吐門各證。氣厥、卽中氣。見本門中氣證。

祕傳證治要訣卷之二

諸傷門

傷風寒（附感冒）凡看病不令染用雄黃末塗鼻孔及須知避息行從客位邊入男子病穢氣出於口女子病穢氣出於陰坐立對語間宜識得向背

傷風、傷寒。俗呼爲傷寒。傳經分三陽三陰。三陽是太陽、陽明、少陽經也。三陰太陰、少陰、厥陰經也。經之陰陽以臟腑言。腑爲陽。膀胱、胃、膽是也。臟爲陰。脾、腎、肝是也。病之陰陽。乃是外邪之陰陽。陰氣陽氣是也。陰陽二氣。皆能犯臟腑。故陽氣犯太陽。則爲傷風。惡風而有汗。陰氣犯太陽。則爲傷寒。惡寒而無汗。在太陽未得解。轉入陽明、少陽二經。則純乎陽。不如太陽易其治。若陽氣未能罷。以次傳入陰經。則爲陰中之陽。蓋緣陽經之陽氣來入陰經。雖有自利、欲寐、脣青、手足厥冷、舌卷、囊縮等證。不可妄投熱藥。宜瀉其陽之在陰經也。

若陽病下之太過。陽氣已脫。遂變爲陰。所謂害熱未已。寒病復起。或初得病。便是陰證。此是陰中之陰。蓋緣陰氣攻陰經。陰自得傳。非自傳諸陽經來。只當以温藥回其陽。故陽入陰者。變陽以救陰。陰入陽者。用陽以救陽。二者不可不辨。

傷風傷寒。初得病時。俱見發熱頭疼體痛。屬太陽經。但傷風惡風有汗。傷寒惡寒無汗。並宜和解散。芎芷

香蘇散。或養胃湯加草芎各半錢。熱服溫覆。若的是傷風。有前自汗惡風等證。可用桂枝湯。令其熱服溫覆。喘加杏仁一錢。咳加五味子一錢。渴加參半錢。外熱未止者。敗毒散。熱而有汗者。敗毒散加桂枝半錢。或陽旦湯。嘔者不宜用桂枝湯。合於本方加半夏一錢。添姜煎。此非合病之嘔。係傷寒雜病。卽非正傷寒。故可用也。風寒二證。理當發汗。而其人虛不可汗者。宜桂枝湯加黃耆半錢。若的是傷寒。有前惡寒無汗等證。可用五積散熱服。厚被覆之取汗。喘嗽者杏子湯加麻黃半錢。欲汗而不得汗者再進。已汗而身熱不退者參蘇飲。或敗毒散加桂枝半錢。嘔者養胃湯。此非治合病之嘔。若風寒俱傷。或惡風而無汗。或惡寒而無汗。疑似之間。只宜五積散半貼。和敗毒散半貼。名交加散。喘嗽者小青龍湯。有初得病太陽證具但寒而未卽爲熱。至一二日後方熱。此傷於寒。若傷風卽有熱矣。但寒未有熱者。五積散發汗。有已服解表藥。不惡風。不惡寒。諸表證已罷。於裏又未躁。未渴。小便亦未赤。大便如常。獨身熱未除者。宜香蘇飲。敗毒散。小柴胡湯加桂枝半錢。有已服解表藥。證已罷。又無裏證。其人體痛不減者。恐是發汗多。榮衞不和所致。宜小建中湯。用半厚半薄之桂。

若風寒二證。傳經後。身熱煩渴。小便赤。大便不通。言語不得。睡不寧。鼻乾。頭目疼。日晡增劇。不惡寒。反惡熱。舌上白胎。中有斷文。或黑胎。方爲極熱。甚則昏不知人。此屬陽明經。宜大柴胡湯。小承氣湯下之。若具諸證。而大便自調者。宜白虎湯。少加小柴胡湯。

若胸脇俱痛。頭疼。耳聾。口苦。或渴或嘔。大小便或利或不利。往來寒熱如瘧。此屬少陽證。宜小柴胡湯。嗽

加北五味子半錢。渴甚加括蔞根半錢。不渴而外有熱者。加桂枝半錢。自汗而尙惡風者。以小柴胡湯半貼。加桂枝湯半貼。

如婦人病中經水適來。或經水失斷。此爲熱入血室。其血必結。故使寒熱往來如瘧。晝則明了。夜則讝語。宜小柴胡湯。或加生地黃半錢。

若胸膈不快。手足自温。或自利而渴。或腹滿時痛。此屬太陰經。或自利不渴。宜理中湯。重則加附子四逆湯。此陰中之陰也。腹滿而痛。當得通塞。宜桂枝湯加芍藥。卽是小建中湯。但易厚桂爲桂枝耳。不愈。小柴胡湯去黃芩加芍藥一錢。或枳芍各半錢。腹痛甚、大便不利者。桂枝湯加大黃一錢。臨熟入。或大柴胡湯。以諸實各痛當下。此陰中之陽也。

若兀兀欲吐。心煩喜寐。或自利口燥而渴。或口中和而背惡寒。此屬少陰經。但少陰用藥有陰陽之分。自利而渴者。宜猪苓湯。蓋陽熱傳入腎。少陰經腎係舌本。故自利口燥而渴。以猪苓湯利腎中之熱。不愈。則當自大便去之。古法合用大承氣湯。若難用大承氣湯。則用小承氣湯。或且進白頭翁湯。上項諸藥。爲陰中極陽者也。

泄利下重。其人四逆。先以水盞半。葱白二根。煎一盞。去葱。煎四逆散至七分。咳加北五味子乾薑各半錢。悸加桂枝一錢。小便不利加茯苓一錢。腹痛加熟附半錢。

若審是下利清穀。手足四逆。其人面帶赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。四逆湯倍乾薑。面赤者加葱一根。腹痛

加芍藥一錢半。嘔加生薑。咽病加桔梗一錢。

若口中和而背惡寒。宜正方四逆湯。不必加減。四逆散、四逆湯。俱治少陰下利。四肢逆冷。泄利下重者。與下利清穀者。一涼一温。又自有陰有陽之別。四逆散是治四逆陽症。四逆湯是治四逆陰症。

若初得病。便見少陰證。其人發熱惡寒。身疼頭不痛者。宜麻黄細辛附子湯微汗之。或五積散加熟附半錢。或五積散加以順元散。若煩悶厥逆。或舌捲囊縮。或下利清穀。裏寒外熱。此屬厥陰經。下利清穀者。陰中之陰。宜進通脉四逆湯。或當歸四逆湯加生薑茱萸。舌捲囊縮。不特陰中之陰有之。陽明之熱。陷入厥陰亦有之。蓋陽明主宗筋。宗筋爲熱毒風所致。故弗榮而急引舌與卵。風以舌捲囊縮。當瀉陽以救陰。宜大承氣湯。陽傳太陰而利。故用小建中湯。及小柴胡湯去黄芩加芍藥。此一藥治太陰洩利。腸鳴而痛已利而痛爲虛。虛則腸鳴。蓋爲傳陰之陽氣漸微。不敢過用冷劑。但以芍藥通塞耳。

南陽謂傷寒手足必微冷。若手足自温者。係太陰也。說欠分曉。若陽明手足安得微冷。少陽厥陰而大冷。安得言微冷。但當言三陰經。少陰厥陰、手足厥冷。惟有太陰、手足自温耳。

凡渴、問其所飲。欲冷欲熱。欲多欲少。若飲多而欲冷者陽渴也。更須審其有何證在經也。其太陽證、小便不利而渴者五苓散。其陽明證、大便不利而渴者宜於前本經求之。已利猶渴。宜白虎湯。其少陽證。寒熱往來而渴者。小柴胡湯去半夏。加括蔞根如其數。陰亦有自利而渴。各已見本經。但陰有渴。古人多有冷劑。以其皆挾陽氣耳。經雖陰而病則陽也。然亦有下利清穀。不係熱利。純是陰證。而反見渴者。此是陰在

下隔陽於上。兼因洩瀉。津液既去。枯燥而渴。其人雖引飲。所飲自少而常喜温。不可投冷劑。宜理中湯。或四逆湯加人參一錢。渴甚連理湯。

有陽證不渴。陰証反渴者。陽明不甚渴。太陰乃大渴。不可不知。治渴一也。有堅腎水而渴止者。有利小便而渴愈者。堅腎水則用天花粉之屬。利小便則用茯苓猪苓之類。蓋太陰以利小便爲先。陽明以利小便爲戒。少陽以膽經半表半裏。未可下之。其人或大渴不止。當以小柴胡湯加天花粉之屬。堅其腎水。腎水既堅。自還滲入大腸。大便微通。熱去而渴解。若病在太陽。太陽在膀胱腎經。非利小便。則熱無從去。渴何由愈。外有非陽一證。煩躁發渴。此乃陰盛隔陽。不當順其渴。惟當治其陰。

煩躁陰陽經皆有之。陽明經胃有熱屎故煩。此當下之。太陽經已得汗而煩者。五苓散。少陽亦或有煩。宜小柴胡湯。陰煩少陰爲多。由陽氣傳入陰經。陰得陽而煩。自利而渴。煩不眠者。辰砂五苓散。若非是陽氣傳陰。陰氣犯陰經。吐利手足厥冷而煩。經云。陽虛陰乘之故煩。又云。陰盛發躁。欲坐井中。吳茱萸湯甚者。四逆湯加葱白二根。

外有虛煩一證。乃是病愈後。陰陽未復。時發煩熱。竹葉石膏湯。痰多睡不寧者。温膽湯。嘔者橘皮湯。詳見寒熱門。潮熱虛煩證。若誤用藥下之。身熱不去。微煩者梔子乾姜湯。

自利須辨陰陽。三陽自利。各已本經見之。太經與陽明合病。下利頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾宜葛根湯。陽明與少陽合病。下利身熱胸脇痞滿而嘔。或往來寒熱目疼鼻乾宜大柴胡湯。大抵陽熱之利。與陰熱之

利。與陰寒之利。自不同。陽利。糞色必焦黃熱臭。出作聲。臍下必熱。得涼藥則止。得熱藥愈增。陰利必洞下清穀。糞色或白或淡黃。臍下多寒。宜温中止瀉之劑。此之謂陰利陽利。指陰陽二氣而言。非曰陰陽二經也。緣陰中亦自有陽利。不可因下利便以爲陰也。

外有太陽證。醫反下之。遂下利清穀。身體又自疼痛者。急用四逆湯救其裏。後得大便已調。身上疼痛。卻用桂枝湯解其表。（先救裏後解表。恐洞下陽脫變生不測。）

又有內不太滿。猶生寒熱。未可下而便下之。內虛熱入。挾熱自利。臍下必熱。大便赤黃色。及下腸間津汁垢膩。名曰利腸。宜白頭翁湯。黃芩湯。

要知均自爲利。身不熱手足自温者。太陰。身體四逆者。少陰、厥陰。其餘身熱下利。皆屬陽經。然陰利有反發熱。或初病無熱。利後卻熱。或初得病卽身熱。繼而自利。此陰利。非陽傳陰經之利。詳見後段發熱證。

又有大便祕五六日。以藥利之。利遂不止。用極熱劑方瘥。陽有利。陽有祕。當更以他證別之。

外熱內煩。下利上渴。或痞或痛或嘔。常法多用黃芩湯。半夏瀉心湯亦可。不若生姜瀉心湯之當。或温膽湯加入黃連。其中枳殼去取在人。

諸陽發熱。已見前三陽經。陰不發熱。惟少陰能發熱。然少陰發熱。有二證。初得病卽見少陰證。發熱惡寒。頭不疼。宜麻黃細辛附子湯。（少陰病始得之。反發熱者。多在表。宜此湯。）

若下利清穀。身熱躁擾。裏寒外熱。仲景謂之反發熱。此乃陰盛隔陽。宜四逆湯。附子理中湯。蓋陽氣傳陰

經而下利者。乃是熱利。陽陷入裏。外所以無熱。陰氣入陰經而下利者。乃是裏寒自利。寒既在裏爲主。則陽氣必客於外。所以外反熱。要知陰陽二證。發熱自是不同。發於陽而發熱者頭必疼。發於陰而發熱者頭不痛。此爲驗矣。

汗下後發寒熱。又發汗後只惡寒者爲虛。虛乃表虛。發汗後只惡熱者爲實。實乃裏實。只惡寒者、是發其汗汗出太過。所謂陽微則惡寒。宜芍藥甘草附子湯。只發熱者、是表已解而裏不消。所謂陰微則發熱。宜大柴胡湯。或小承氣湯。

又有汗下後陰陽不相入。水火不相濟。致餘熱未退。不可更用冷藥。內外俱未可攻。宜小建中湯。若其人已虛。虛能生熱。宜小建中湯加當歸一錢。或四君子湯加黃耆半錢。或十全大補湯調其榮衛。虛者四桂湯眞武湯。審之是邪熱未解。雖經汗下。卻不畏虛湯養病宜竹葉石膏湯。

又有潮熱一證。經云潮熱者。胃家實也。屬陽明經。當下。此之潮熱。乃獨熱往來。多於日晡時發。如潮之期長落。非若先寒後熱。寒往卽熱來此也。

外有病瘥後。多食發熱。名曰食復。作勞發熱。名曰勞復。復者。愈而復作之義。食復宜小柴胡加大黃一錢。勞復宜枳實梔子湯。或小柴胡湯。今人有澡心浣衣沐髮易床之戒。遂以幽冥鬼神之說。蓋慮患者初愈。以垢穢爲嫌。作勞太過。致成勞復耳。

嘔吐。有寒熱二證。無物爲嘔。有物爲吐。何以爲吐有物。古語只聞有乾嘔。不聞乾吐。太陽與陽明合病。身

熱頭疼項強煩熱鼻乾目疼而嘔宜葛根湯加半夏一錢。太陽與少陽合病。頭疼腰疼往來寒熱胸脇疼痛而嘔宜黃芩湯加半夏一錢半入生薑五片煎。若少陽證俱不係合病。嘔而熱者宜小柴胡湯。若陽明證具。雖顯然有可下之者。兼之嘔多猶屬上焦。未可遽下。宜小柴胡湯。若太陽不與少陽陽明合病。而獨見太陽證。或吐瀉者。恐病人膈間素有痰飲停飲傷滯。且以二陳湯定之。候嘔吐定。徐進解太陽經藥。若先嘔卻渴者。宜猪苓湯。先渴卻嘔者。宜治膈間有水。小半夏茯苓湯。渴欲飲水。水入卽吐。吐已復渴。名曰水逆。由心經受熱。而小腸不利也。宜五苓散。若少陰不渴而吐。或乾嘔者。理中湯去白朮加生姜。嘔而吐涎沫者。吳茱萸湯。太陰厥陰間有嘔吐。太陰宜理中湯。厥陰宜四逆湯。並加生姜煎。已上陰證。乃陰中之陰。宜用熱劑。陽入陰者。能爲利而不爲嘔。嘔屬上而近於外也。陽之所入者深。故利也。又有陽證病新瘥後見嘔。別無所因。此餘熱在胃脘也。宜竹葉石膏湯。或橘皮竹茹湯。

大凡得之太陽而嘔者。必是合病。嘔乃病漸入內。非正太陽也。曾記有人初得病。太陽證在。嘔吐不止。藥投暖劑。莫能治之。知太陽已汗解。固當用冷劑。是太陽見嘔。非合陽明。則合少陽。其嘔爲熱。用暖劑非矣。

（曾見太陽證大嘔。因嘔吐藥只解表自除。）

又記人有初病具太陽證。而嘔。一家少長。患狀悉類。進養胃湯八服。無不立效。此時行之氣。適然如此。是爲傷寒雜病。又非可以正經傷寒律之。

面赤。分陰陽毒。太陽不解。陽氣怫鬱。令人面赤。宜敗毒散。下虛、故面戴陽而赤。此陰證。更審有何病。在何

經用藥施治。

仲景謂咳逆爲噦。有陰陽二證。陰證乃胃寒所生。亦有初本是熱。因大發汗後。復吐下之。攻熱太過。以致胃寒。因寒而咳逆者。橘皮乾姜湯。或半夏生姜湯。咳逆就枯梗枳殼湯中、加半夏陳皮等分。生姜十片煎。亦治陰咳逆。陽證咳逆。乃胃家熱。小柴胡湯。橘皮竹茹湯。陽咳逆而又兼腹痛者。問其前後知何部不利。前部猪苓湯。後部調胃承氣湯。

發黃有陰陽二證。陽證發黃。胃熱蓄在脾胃。瘀熱與宿穀相搏。蒸鬱而黃。凡病人身體發熱。頭面汗出。頸以下都無汗。渴飲水漿。小便不利。通身頭目悉黃。身乾無汗。溺又不利。則熱不外越。必蘊蓄而成黃證。宜五苓散。用茵陳煎湯調。或梔子湯調服。

又有瘀血一證。偏身亦黃。但瘀血則發狂。大便必黑。小腹按之急痛。而大便卻自利。以蓄血不利小便也。宜桃核承氣湯。

陰黃。乃太陽經中濕。體痛發熱。身如薰黃。終不如陽黃之明如橘子色也。當叩其小便之利與不利。小便自利。朮附湯小便不利。大便反快者。五苓散。

痓有剛痓柔痓。又有陰痓陽痓。痓有汗爲柔。無汗爲剛。緣先因傷風。又感寒濕。致然。外證俱能發熱惡寒。頭頸強急。腰背反張。或瘛瘲口噤。狀如發癎。又如產後角弓反張。風痓。小續命湯。皆可用。審是柔痓有汗者。桂枝湯加葛根一錢。重則附子防風散。

審是剛痙無汗宜葛根湯若胸滿口噤臥不着席腳攣咬牙不惡寒者大承氣湯發狂陽證有二陰證有一陽證蓄血如狂已見發黃條中陽毒發狂躁而狂走妄言叫罵如見鬼狀面赤咽痛鼻如烟煤或身斑如錦或下利赤黃宜陽毒升麻湯陰證乃是病發於少陰不當正發汗醫見其惡寒遂強發之汗因漏不止其人亡陽故狂大略與陰極發躁同南陽云亦無此一證當用陰躁之藥加以收汗之劑玉屏風散入熟附子一錢仍外以温粉傅之或冷汗自出手足逆冷其人狂不止者宜四逆湯（陰發狂亡陽證多死）冷進

醫治傷寒多問其小便利不利赤不赤以別其陰陽亦有小便自利偏數多所出自少色不甚清不可因其利而遽謂之陰必是小便如常清而不赤又無諸陽證方信裏之無熱若病在太陽身體熱太陽屬膀胱未有小便不赤者不可因其赤遽謂之實熱必是小便如灰汁或如陳酒或如血色無諸表證方見其熱已入裏又有因發汗過多津液枯竭以致小便不利或澁而赤醫者往往利之重竭其澤液又陽明病不大便而小便赤澁或誤利其小便則津液愈無胃愈乾燥此又利小便之戒

不得眠陰陽皆有之正病於不得眠者陽明也若少陰當病於欲寐今乃不得眠緣陽氣入少陰經非少陰正病也仲景云二三日身熱目疼鼻乾不得臥者陽明也於前陽明證中求藥少陰下利而渴六七日欬而嘔心煩不得眠宜猪苓湯若少陰病得之三二日以上心中煩不得眠黃連阿膠湯外有因發汗大過胸中煩躁不得眠欲飲水者少少與之其人發渴小便不利者五苓散若因吐下後心煩氣乏晝夜不

得眠宜酸棗湯若下後復汗晝夜煩躁不得眠夜則安靜不嘔不渴身無大熱者是汗太過陽氣衰遂成陰證乾姜附子湯外有傷寒已解或因飲食復劇煩悶乾嘔口噪呻吟錯語不得眠宜黃連解毒湯又有病瘥後自不得眠宜溫膽湯或眠而精魂散亂異夢驚悸者溫膽湯尤宜

古論鼻衄屬太陽經風寒皆有之既衄而表證仍在於寒當用麻黃湯於風當再用桂枝湯且謂發煩目瞑極者必衄既發煩目瞑豈純是太陽經兼陽明之脈循鼻是太陽侵入陽明汗下俱難若衄已而熱不退者惟升麻葛根湯敗毒散陽旦湯爲穩衄而煩渴飲則吐水先服五苓散次服竹葉石膏湯大衄不止宜茅花湯或黃芩芍藥湯加茅花一撮

若少陰初得病醫誤以正發汗之法致迫血動經妄行而衄其血非獨出於鼻或從口中或從耳目又有陽陷入陰四肢厥逆醫見其厥謂寒邪在表從而汗之當下反汗以致動血是謂下厥上竭爲難治先哲云桂枝下咽陽盛則斃正以此也要知汗不出徹爲陽之衄誤發其汗爲陰之衄二者大不同也又云陽盛陰虛汗之則死

惡寒陰陽皆有之太陽經傷寒病在表故惡寒少陽半在表半在裏亦微惡寒陽明在裏本不惡寒陽明或惡寒者與太陽合病未可下宜小柴胡湯

三陰惟少陰經有惡寒之證太陰厥陰皆不惡寒然少陰惡寒又有二證發於少陰者無熱而惡寒宜溫之屬理中湯四逆湯少陰無熱惡寒似與前太陽經未卽熱一條相似所謂寒未卽熱者爲太陽證具而

未熱耳。此之無熱惡寒。蓋無太陽頭痛等證。知爲少陰也。陽氣傳入少陰者。或惡寒而倦。時時自煩。不欲厚衣。屬大柴胡湯。

若太陽得汗後。大惡寒者。表虛也。芍藥甘草附子湯。表虛惡寒。而筋惕肉瞤者。眞武湯。外有太陰自利不渴。厥陰下利厥逆。俱或惡寒。太陰宜理中湯。厥陰宜四逆湯。前既言二陰不惡寒。今又言或惡寒。要知太陰厥陰。皆不惡寒者。此陽傳陰者也。三陰皆能惡寒者。陰入陰者也。特在少陰爲多耳。皆惡寒有二證。三陽合病。皆惡寒者。必口中不仁。口燥舌乾也。少陰病皆惡寒者。必口中和也。以此別之。合病白虎湯。少陰附子湯。仲景云有熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。與此理同。

身體痛。陽證病在太陽。陰證病在少陰。厥陰在太陽。宜汗。於前本經求藥。自利而身體痛。無熱證者。爲陰病也。急當救裏。宜四逆湯附子湯。眞武湯。去芍藥加乾姜。或加官桂。如其數若發汗後。身大痛不止。宜小建中湯。和其榮衞。加以筋惕肉瞤者。眞武湯。外有陰毒身疼。如被杖。與中濕風濕等證。皆能身體痛重。活人書載之。以詳。茲不復述。

自汗九證。備見活人書。但少陰不得有汗。而或反自汗出。以陽氣衰少。無以固陰液。故汗不當出而出。宜眞武湯。陽明病。法多汗。而或反無汗。如蟲行皮中狀者。以病人久虛。津液竭。不能爲汗。宜用黃耆建中湯。得津液既和。而陽明證仍在。徐用小柴胡湯。若太陽發汗多。遂漏不止。其人惡風。宜桂枝湯。加熟附子一錢。漏汗而筋惕肉瞤。身欲振振摇地者。眞武湯。外有頭汗數證。引飲。小便不利。身必發黃。已見前發黃證。

胸脇微痛。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。小柴胡湯。心下緊滿。無大熱。但頭有汗。此名爲水結胸。以頭汗別水結證。小半夏茯苓湯。內加苓倍半夏。

白胎。舌上微白者。未可便爲熱證。必胎白而厚。其上如刺焦裂破紋。摸之略無小潤。甚成黑胎。方爲熱極。加以下證悉具。無表裏證。方可用小承氣湯。大柴胡湯。亦有病屬陰證。下利清穀。陽氣客於上焦。煩躁引飲。舌胎如前證。或鼻烟煤。欲去衣被。不可誤以爲陽。附子理中湯。四逆湯冷服。

陰陽之病。皆能發厥。故有陽厥。有陰厥。皆病之深也。二厥惟陽厥易誤。當問其初得病如何。若初得病。頭不痛。四肢逆冷。足多蠕臥。而惡寒或汗。自引衣蓋覆。或不渴。或利清穀。或小便自調。人多惺惺而靜。此寒厥也。是爲陰中之陰。宜四逆湯。附子理中湯。若初得病。頭痛身熱。外別有陽證。至五六日方發厥。其人雖厥。或畏熱。或飲水。或揚手擲足。煩躁不得眠。大便祕。小便赤。多昏憒者。此熱厥也。是爲陰中之陽。宜白虎湯。或大承氣湯。熱厥雖手足冷。而指甲煖。不若寒厥。并指甲俱冷。此辨陰陽要法也。

近有陽病。自腰以上極熱。兩腳常冷。蓋三陰脉上不至頭。故頭不疼。三陽脉下不至足。故足冷也。

咽喉痛。有陰陽二證。面赤。身發斑如錦。唾膿血。而咽喉痛者。此陽毒證。宜陽毒升麻湯。手足厥冷。或吐利而咽喉痛者。此少陰證。宜通脉四逆湯。於中加桔梗一錢。

又有非是暴寒中人。伏氣於少陰。經旬月方發。先咽痛而次下利。宜半夏桂甘湯。謂之腎傷寒。此證人罕知。

亦有初得病。頭痛發熱。無陽毒少陰諸證。而咽喉自痛者。此因感冒後。頓厚衣被。或用蠻法。服生姜熱酒

卽臥。遂成上壅。或先有壅熱。欲取涼快。致爲外邪所襲。旣有風寒。又有熱壅。宜參蘇飮。倍桔梗。加木香半錢。或消風百解散。或敗毒散。或五積散。敗毒散。各半貼。名交加散。

腹肚滿痛。有陰陽之別。腹痛屬裏。正太陽經腹不痛。少陽有胸脇痛而無腹痛。若有陽明腹滿急而痛。此爲裏實。宜大柴胡湯。小承氣湯。此總論三陽經陽中之陰。三陰下利淸穀。而又腹痛者。裏寒故也。四逆湯。附子理中湯。陽氣傳太陰經。腹滿而痛。其證有二。有實痛。有虛痛。腸鳴泄利而痛者。虛痛也。此獨論太陰經陰中之陽。小建中湯卽桂枝加芍藥湯。但桂有厚薄耳。不瘥則小柴胡湯去芩加芍藥如數。腹滿大便祕。按之痛者。實痛也。桂枝湯加大黃一錢。此之虛痛實痛。乃是以陽邪漸消爲虛。陽氣正大爲實。又陽氣傳少陰。六七日。腹脹滿。不大便者。當下。宜大承氣湯。痞結胸。皆誤下所致。按之胸膈石硬而痛。小結胸也。不按自痛者。大結胸也。心下滿而不痛者。痞也。惡寒身熱。病發於陽。未有下證而反下之。則爲結胸。惡寒無熱。病發於陰。不當下而反下之。則爲痞。二證之中。又各分陰陽。痞結胸皆應下。表未解尙惡寒者。且宜解表。用桔梗枳殼湯。和桂枝湯各半貼煎。如表已解。則可用小陷胸湯。以攻小結胸。大陷胸湯。以攻大結胸。或先宜用桔梗枳殼湯。不效則用大小陷胸湯。此大小結胸。乃爲熱結。其人必煩躁渴。心中懊憹。（仲景云結胸症。脉尙浮。未全結也。宜桂枝湯。）又有寒實結胸。雖痛而無煩躁等證。此因下後虛逆。寒氣獨結。宜理中湯加枳實半錢。茯苓一錢。或枳實理中圓。（寒實結胸。仲景用三白散。）

又有水結胸。無大熱證。頭微汗出。宜小半夏茯苓湯。如寒痞。則用理中湯加枳實半錢茯苓一錢。或枳實理中圓。陽痞時有熱證者。先用桔梗枳殼湯。次用黃連瀉心湯。雖有熱而復惡寒汗出者。附子瀉心湯。表解而胃中不和。心下痞硬。乾噫食臭。腹中雷鳴。下利者。生姜瀉心湯。或甘草瀉心湯。痞而有陰陽雜證。半夏瀉心湯。痞而渴。飲水即吐者。五苓散。亦有不因誤下而自痞者。審在何經。且當治本經病。痞甚則攻其痞。

大結胸爲陽。然亦有陰結。用理中熱劑。痞則爲陰。亦有陽痞。用三黃涼劑。此蓋隨陰陽變通。不可執也。

喘嗽有陰陽。太陽經喘嗽略於前本經言之。詳見嗽門。少陽有嗽無喘。有喘非少陽也。其見少陽證而嗽者。宜小柴胡湯。加北五味六分。乾姜四分。陽明有喘無嗽。有嗽非正陽明也。其陽明證喘有潮熱者。宜大承氣湯。陰證喘。惟少陰有之。若四肢沉重疼痛。小便如常。大便自利而嗽者。眞武湯去芍藥。加北五味乾姜各半錢。細辛三錢。此陰中之陰。若四肢厥逆。腹中痛。泄利下重。而咳。四逆湯加北五味乾姜各半錢。下利嘔渴。身煩不得眠而咳嗽者。猪苓湯。此陰中之陽。諸陰喘促。最爲危證。反陰丹。

讝語屬陽。鄭聲屬陰。經云實則讝語。虛則鄭聲。讝語者。顚倒錯亂。言出無倫。常對空獨語。如見鬼狀。鄭聲者。鄭重頻繁。語雖謬。而諄諄重復。不自已。年老之人。遇事則諄語不休。以陽氣虛故也。此讝語鄭聲。虛實之所以不同也。二者本不難辨。但陽盛裏實。與陰盛隔陽。皆能錯語。須以他證別之。大便祕。小便赤。身熱煩渴而妄言者。乃裏實之讝語也。小便如常。大便洞下。或發躁。或反發熱而妄言者。乃陰隔陽之讝語也。

裏實宜下。調胃承氣湯。熱躁甚而妄言不休。大渴喜冷。宜理中湯。陰隔陽宜溫膽湯。四逆湯。附子理中湯。又有不係正陽明。似困非困。間時有一二聲譫語者。當隨證施治。

外有已得汗。身和而言妄者。此是汗出後津液不和。愼不可下。乃非陽非陰者。宜小柴胡湯。和建中湯各半貼。和榮衛。通津液。若陽傳入陰。自利。手足厥逆。語或錯亂。此雖已自利。其中必燥屎。猶當下之。陰中之陽。宜調胃承氣湯。瘀血在裏。大便黑。小便利。小腹痛。其人如狂。譫語者。桃核承氣湯。婦人傷寒發熱。經水隔斷。此熱入血室。其血必結。亦能譫語。宜小柴胡湯。病後血氣未復。精神未全。多於夢寐中。不覺失聲如魘。此不係譫語。鄭聲。宜溫膽湯。去竹茹、入人參半錢。或用六君子湯。

多寐四證。風濕多寐。見活人書。不可更發汗。宜敗毒散。屬陽經。

久不得寐。一旦欲寐。別無餘病。此爲陰陽和而愈也。若少陰得病。但欲寐者。急投四逆湯。

外有狐惑。忽忽喜寐。當於活人書求之。

小便難。須別陰陽。經云。陰虛則小便難。然陰虛則陽必湊之。於小便故難。而其色赤黃者。爲陽所湊。中有熱也。是陰血虛。不足以勝陽氣。則陽盛而便難。宜五苓散加滑石末。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。四肢微急。難以屈伸。而小便難者。是陽氣虛。不足以固陰液。則液乾而便難。宜桂枝湯。加熟附子一錢。或更加茯苓。又有陽明短氣。腹滿。脇下及心痛。鼻乾。不得汗。身黃。小便難。潮熱而噦者。小柴胡湯。加茯苓一錢。經云日晡所發潮熱者。胃家實也。此屬陽明當下證。然亦有每至晡時發熱。五更復退。而大便自利。用薑

附辛熱劑而愈。豈可以日晡潮熱。遽謂之陽。遽謂之實。要須以他證參之。愚曾治患人沈其姓之子。乃所親見而親試者也。

三陽有頭痛。三陰無頭痛。此論古矣。然陰間有頭痛。厥陰循喉嚨之後。與督脉會於顛。陽間不頭痛。似非正法。曾治隣叟范家身熱。頭略不痛。進小柴胡湯八服纔愈。亦不可不知。諸病已解。無別證。但頭疼者。連鬚葱白。生姜煎湯。若發汗太過。致頭疼甚者。宜小建中湯。加芎一錢。

陽病能食。陰病不能食。熱則消穀善飢。陰證能食。爲欲愈。以陽氣復也。然猶不可多與之食。恐脾氣尚怯。不能消化。陽病不節食。則增病。愈後多食。則病復生。古謂之食復。今謂之發哺。以穀氣多。則助陽氣。稼穡作甘。辛甘辛發散爲陽也。所以病後虛寒一證。先賢以爲愼穀則愈。

傷寒治法。陽有此證。陰亦有此證。似陽而陰。似陰而陽。最難分別。毫厘之差。千里之謬。前之所流。慮正反此。故逐條辨論。其如陰毒、陽毒、風溫、濕溫、溫疫、溫瘧、吐血、吐蚘、發斑、兩感、百合、狐惑、陰陽易、毒心氣包絡。當並遵南陽活人書。用藥何在。具陳。況治傷寒大綱。不出陰陽。舉其綱。則雖節目纖悉。有未能盡。不妨於活人書參考。胃中冷。必吐蚘。吐蚘人能皆知爲陰也。然亦有陽證吐蚘者。蓋胃中空虛。既無穀氣。故蚘上而求食。至咽而吐。又看別證如何。不可專以胃冷爲說。曾記一人。陽黃吐蚘。又大發斑。陽毒證。口瘡咽痛。吐蚘。皆以冷劑取效。非亦有陽證矣。傷寒先犯太陽。以次而傳。此特言其概耳。然其中變證不一。有發於陽。卽少陰受之者。有夾食傷寒。食動脾。脾太陰之經。口得病。卽腹滿痛者。亦有不循經而入。如初得病。徑

犯陽明之類。不皆始於太陽也。亦有首尾止在一經。不傳他經。亦有止傳一二經而止者。不必盡傳諸經也。至如病之踰越。不可泥於次序。當隨證施治。所以傷寒得外證爲多。仲景云。日數雖多。有表證者。猶宜汗。日數雖少。有裏證者。卽宜下。

右論。少陽居陽明之次。此以五行生尅論。若謂陽主生。則水生木。太陽膀胱陽水。合傳之少陽膽木。兼太陽在表。少陽表裏之間。陽明在裏。自外漸入內。次第正當。如此。果如傷寒論中所說。一日太陽。二日陽明。三日少陽。豈可第二日病在裏。而第三日方半表半裏者乎。愚固不能輒反其說。然於心終所未安。

傷寒六日。或七日。若一手有脈。若兩手俱無。此欲成候也。宜半夏瀉心湯。或生姜瀉心湯。此合病之劑。

陽明下證已具。其人喘嗽。或微惡寒。爲太陽陽明。或往來寒熱。爲少陽陽明。於陽明證中。而有太陽少陽證未罷。此非正陽明也。愼未可遽下。所以古注陽明有三。常須識此。

有傷寒雜病。有傷寒正病。傷寒雜病者。難以正病治。如病人證狀不一。有冷有熱。陰陽顯在目前。當就其中大節先治。徐治其餘證。然亦不可用獨熱獨寒之劑。又如嘔渴煩熱。進小柴胡湯。嘔渴煩熱者止。而下利不休。以小柴胡湯爲非。則嘔渴煩熱不應止。以爲是。則下利不應見。吐利厥逆。進附姜湯。吐利厥逆止者。而熱渴譫語。昏不知人。以姜附爲非。則吐利厥逆不應止。以爲是。則熱渴譫語不應見。此亦傷寒雜病。雖無前項冷熱二證。顯然並見之跡。而陰中有陽。陽中有陰。潛伏其間。未卽發見。用藥一偏。此衰彼盛。醫者當病有可疑之處。能反覆體認。無致舉一廢一。則盡善矣。

傷寒有壞病者。緣已發汗吐下。仍不解。爲壞病。如或病中。又感寒熱異氣。若重感於寒。則先熱後寒。而爲溫瘧。重感於風。則四肢不收。頭疼身熱。常自汗出而爲風溫。重感溫熱。則身發斑。爲病最重。而爲溫毒。至此。則經候傳變。無復紀綱。皆名壞傷寒。當活人書中本病而治之。

傷寒要緊處。在分表裏。而爲汗下。有病人自汗自下者。有醫用藥汗之下之者。中間節目頗多。汗藥宜早。下藥宜遲。此亦大綱之論耳。且如失血家不可發汗。淋家不可發汗。如此等類。豈宜遽用表劑。當徐徐解散。

苟或不當汗而強汗。則津液耗竭。變生百病。因茲夭傷。豈可一以汗藥宜早爲說。陽明汗出而多。宜急下。少陰下利而渴。宜急下。厥陰舌卷囊縮。宜急下。如此等證。當速用利下之劑。苟或當下而不下。則熱毒轉深。遂致失下。不可救療。豈可一以下藥宜遲爲說。

又發汗法。但欲遍身濈濈。不欲如淋漓。下之法。進一服後。如人行十里許未通。方進次服。已通之後。服不必盡劑。傷寒用藥。不可輕易解表。雖當用麻黃桂枝。亦且先用芎芷朴朮。如和解散。芎芷香蘇飲加蒼朮之類。攻裏雖當用大承氣大柴胡。且先用小承氣小柴胡。又陰證雖合用四逆湯。且用理中湯。欲用眞武湯。且用三白湯。庶不失古人重畝之意。若證候已危。不可失機。勿拘此說。

傷寒有陰證而頭或疼。未有正陽證而頭略不疼者。有陰證而反發熱。未有正陽證而身不熱者。有陰證而或小便自赤。未有正陽證而小便不赤者。此當正法也。

感冒爲病。亦有風寒二證。卽是傷寒外證。初感之輕者。故以感冒名之。若入裏而重。則是正傷寒。初感用藥與前項太陽證亦同。今病人往往惡言傷寒。不知輕則爲感。重則爲傷。又重則爲中。有其病而諱其名甚爲無義。特以俗呼爲大病。故諱言之耳。

曾人發熱畏寒。身疼頭痛。醫謂太陽證。以五積散表之。六日後。發渴譫語。大便自得。病竟不通。用小柴胡湯。繼以大柴胡湯。得利後。忽四肢逆冷。舌卷囊縮。氣息喘急。面裏睡臥。用眞武湯。利不止。而病如故。遂用附子理中湯。四逆湯。方得利止。手足稍温。當夜貼然。次日忽又發熱。譫語口渴。小便赤痛。又經六七日。大便仍復不通。再用潤腸圓。通得大便。而諸證不減。後來只用温膽湯。加人參。及減桂五苓散。久而漸愈。此病用涼藥則陰勝。隨手輒變。皆是用之過也。若四逆之後。陽證仍復。醫苟不審。再用大柴胡承氣之屬。必又復爲陰。所以終收功於温膽湯五苓散。以平穩故也。故出爲用藥太過之戒。

春病曰温。夏病曰熱。不出此諸證。但因時而異其名耳。其時有不正之氣。感襲於人。因得時氣之名。今俗總呼爲傷寒。只是天氣尚熱。古人有用熱遠熱之戒。桂枝湯宜加黄芩。名陽旦湯。五積散宜加石膏升麻知母。其眞武湯。乃陰證之先劑。或未敢遽用熟附。則不若生附爲穩。或半生半熟。若其人多痰。附子尤宜生用。尋常感冒。和解散、香蘇飲。或可加蒼朮。不換金正氣散。普賢正氣散。對金散子。養胃湯。皆是面手表散之劑。解肌熱。及上焦熱。參蘇飲。敗毒散。百解散。十神湯。

太陽有風與寒之不同。三陽有正證合病之不同。不可不別。

北人初得病。以蒼朮麻黃並用相半。爲發汗第一義。纔覺壯熱。便用防風通聖散。南北殊俗。其稟受素實故也。

曾記一老成人言。感冒服發汗藥。得汗證候盡除。只身熱未退。再用熟藥。而熱仍在表裏都無別病。溫涼汗下俱所不可者。宜進養正丹四五十粒。病愈後別無他證。只微熱未盡除。其人脾氣久虛。欠調理。脾主肌肉。故生餘熱。燥補不可。宜用理中湯加蜜一匙頭許煎。

元是陽證。因汗下大過。遂變成陰。便當作陰證治。卻不可。謂其先初是陽。拘拘於陽傳陰之說。乃是三陽壞證轉爲陰也。此爲陽之反。而非陽之傳。

有虛人感冒發熱。纔得一日。熱不爲久。又不爲重。便見譫語。此乃虛不禁熱。不可遽用十分冷劑。

三陰頭痛。非是正病。然陰盛隔陽者。亦有頭疼。以其病本在陰。而陽又爲陰所病。故亦見陽證也。

有元是陽證。因冷劑太驟。遂見下利不止。而諸陽證仍在。略不少衰。此當以煖藥固其下。而稍定。又宜隨證治之。不可用熱。初病是陽經見頭疼。以次陽傳入陰。頭略不疼。不可便謂不疼爲陰證。須問其得病之初。頭疼與否。

有汗下而熱不退。多用涼肌藥。而又不退。動至半月。或兼旬者。乃是陽氣離經。不能復還。客於皮肉之間。病此甚衆。此當調補收斂之。不可用辛熱重劑藥。又病六七日。候至寒熱作汗之頃。反太躁擾。復得汗而

解。蓋緣候至之時。汗已成而未徹。或者當其躁擾。誤用冷劑。爲害非輕。不可不審也。

有微惡風。微發熱。起居飲食自如常。但不甚清快。又不可過用表劑。若投以和解、養胃、清金之類不效者。宜神朮散。有陽證下後。熱退脉平。而神思恍惚。昏昏不知痛痒處。不省人事。如癡如痞。不可謂其爲虛。妄投補劑。只一味參湯、或不藥自愈。

陽證身熱。而胸膈痞塞者。減枯梗枳殼之半。前胡柴胡足其數。

傷暑

傷暑必自汗背寒。面垢。或口熱煩悶。或頭疼發熱。神思倦怠殊甚。所謂暑傷氣。而不傷形。是也。但身體不痛。與感風寒異。宜香薷飲。六和湯。香薷湯。

嘔而渴者。浸冷香薷湯。或五苓散。兼吞消暑圓。嘔不止者。枇杷葉散。去茅根。吞來復丹。嘔而痰。卻暑散。吞消暑圓。或小半夏茯苓湯。或消暑飲。

瀉而渴者。生料平胃散。和生料五苓散各半貼。名胃苓飲。間進來復丹。此丹本非治瀉之藥。惟施之暑瀉則宜。然瀉甚亦不可用。瀉定仍渴。春澤湯。或縮脾飲。傷暑心頭痞悶。人皆謂暑毒攻心。不知有暑即有痰。痞悶者痰爲之也。

盛暑塗中。倉卒無水。渴甚。急嚼葱頭二寸許。抵飲水二升。

瀉而復痛。有積者。生料五苓散。藿香正氣飲。勻各半貼。若瀉雖無積。其腹痛甚。生料五苓散。加木香七分。

或六和湯加木香半錢或不加木香止與二藥煎熟去滓調下蘇合香圓
又有不渴而腹乾痛者六和湯煎熟調蘇合香圓尤宜
瀉而發熱者胃苓飲瀉而發渴者胃苓飲兼進縮脾飲瀉渴兼作未透者湯化蘇合香圓吞來復丹或研來復丹作末白湯調下已透者香薷飲感冒外發熱者六和湯香薷湯香薷飲身熱煩者五苓散或香薷湯加黃連一錢熱而汗多畏風甚者生料五苓散熱而渴者五苓散兼進縮脾飲
暑氣攻裏熱不解心煩口乾辰砂五苓散或香薷飲加黃連一錢若大渴不止辰砂五苓散吞酒煮黃連圓
暑氣攻裏腹內刺痛小便不通生料五苓散加木香七分
冒暑飲酒引暑入腸內酒熱與暑氣相并發熱大渴小便不利其色如血生料五苓散去官桂加黃連一錢五苓散去桂吞酒煮黃連圓
暑氣入腸胃而小便艱澁不通者加味香薷飲仍佐以三黃圓
暑氣入心身煩熱而腫者宜辰砂五苓散或香薷飲加黃連一錢
傷暑而傷食者其人頭疼背寒自汗發熱畏食惡心噫酸臭氣胸膈痞滿六和湯倍砂仁
若因暑渴飲食冷物致內傷生冷外傷暑氣亦宜此藥暑偏要入心者心屬南方離火暑氣所入各從其類小腸爲心之腑利心經暑毒使由小腸中出五苓散利小便爲治暑上劑也

有傷於暑。因而露臥。又爲冷氣所入。其人感暑復感冷。自汗怯風。身疼頭痛。去衣則凜。着衣則煩。或已發熱。或未發熱。並宜六和湯。內加扁豆砂仁。一方用藿香。一方用紫蘇。正治已感於暑。而復外感於風寒。或內傷生冷。以藿香紫蘇。兼能解表。砂仁扁豆。兼能温中。然感暑又感冷。亦有無汗者。只宜前藥。若加以感風。則斷然多汗。審是此證。宜生料五苓散。內用桂枝爲佳。市井中多有病往往日間冒熱。經營夜間開牕眠臥。欲取清涼。失蓋不覺。用藥所當詳審。有此證而發潮熱。似瘧猶未成瘧者。六和湯養胃湯。各半貼。相和煎。有此證而鼻流清涕。或鼻孔熱氣時出。六和湯加川芎半錢。羌活七分。

有因傷暑。遂極飲以冷水。致暑毒留結心胸。精神昏憒。語音不出。煎香薷湯。化蘇合香圓服。

有因傷暑。用水沃面。或入水洗浴。暑濕相搏。自汗發熱。身重。小便不利。宜五苓散。

傷暑而大汗不止。甚則眞元耗散。宜急收其汗。生料五苓散倍官桂。或加黃耆如朮之數。此亦古法也。

傷暑自汗。手足厥冷者。煎六和湯。調蘇合香圓。

傷暑自汗。手足時自搐搦者。謂之暑風。緣已傷於暑。毛孔開。而又邪風乘之。宜香薷飲。或香薷湯。並可加羌活一錢。痰盛者六和湯半貼。和星香散半貼。

暑月身痒如針刺。間有赤腫處。亦名暑風。末子六和湯。和消風散。酒調服。暑風而加以吐瀉兼作者。六和湯藿香正氣散。各半貼。加全蝎三箇。

有毒暑客於上焦。胸膈痞塞。湯藥至口卽出。不能過關。或上氣喘急。六和湯浸冷。調入麝香少許。

伏暑煩渴而多熱痰者。於消暑圓中每兩入黃連末二錢。名黃連消暑圓。或二陳湯。或小半夏茯苓湯。並可加黃連一錢。暑氣久而不解。遂成伏暑。內外俱熱。煩躁自汗。大渴喜冷。宜香薷飲加黃連一錢。繼進白虎湯。若服藥不愈者。暑毒深入。結熱在裏。譫語煩渴。不顧去近衣。大便祕結。小便亦澁。當作熱病治。可於傷寒陽明證求藥。

傷濕附痹

傷濕爲病。發熱惡寒。身重自汗。骨節疼痛。小便祕澁。大便多泄。腰腳痹冷。皆坐臥卑濕。或冒雨露。或着濕衣所致。並除濕湯。

又前諸證而腰痛特甚。不可轉側。如纏五六貫重。皆由濕氣入腎經。腎屬水。從其類也。宜腎着湯。或滲濕湯煎服。

小便祕大便溏者。尙書。雨淫腹疾者是也。五苓散。吞戊巳圓。戊巳屬土。土能尅水。因以得名。五苓乃濕家之要藥。經云。治濕不利小便。非其治也。義蓋取此。

傷濕而兼感風者。既有前項證。而又惡風。不顧去衣被。或額上微汗。或身體微腫。汗漬衣濕。當風坐臥。多有此證。宜除濕湯。桂枝湯各半貼和服。合微發汗。若大發其汗。則風去濕在。已得汗而發熱不去者。敗毒散加蒼朮一錢。防風半錢。

傷濕又兼感寒。有前諸證。但無汗。慘慘煩痛。宜五積散。和除濕湯各半貼。微發汗已。仍復熱而渴者。除濕

湯半貼和五苓散半貼。

傷濕而兼感風寒者。汗出身重。惡風喘滿。骨節煩疼。狀如歷節風。臍下連腳冷痹。不能屈伸。所謂風寒濕合成痹。宜防己黃耆湯。五痹湯。詳五痹。用藥於風濕最宜。若因浴出。未解裙衫。身上未乾。忽倒熟睡。致及腎經。外腎腫痛。腰背攣曲。只以五苓散一貼。入眞坯少許。下青木香圓。如此三服。臟腑纔過。腫消腰直。其痛自止。

傷酒

傷酒。惡心嘔逆。吐出宿酒。昏冒眩暈。頭痛如破。宜冲和湯。半夏茯苓湯。或理中湯。加乾葛七分。或用末子理中湯。和縮脾飲。酒渴縮脾湯。或煎乾葛湯。調五苓散。久困於酒。遂成酒積。腹痛泄瀉。或暴飲有灰酒。亦能致然。並宜酒煑黃連丸。多飲結成酒癖。腹中有塊。隨氣上下。冲和湯。加蓬朮半錢。酒停胸膈。爲痰飲者。枳實半夏湯。加神麥孽各半錢冲和湯。加半夏一錢。茯苓七分。多飲酒積入脾。遂成酒黃。詳見拾遺門疸證。

傷食

傷食之證。胸膈痞塞。吐逆嘈酸。噫敗卵臭。畏食。頭痛。發熱惡寒。病似傷寒。但身不痛耳。治中湯。加砂仁一錢。或紅圓子。小七香圓。和服。

食過多而傷。停留中脘。聞食氣則嘔。二陳湯。加砂仁一錢。未愈。更加丁香半錢。或治中湯。加砂仁一錢。丁

香十粒。大嘔不止者。大便去之。枳實半夏湯。加砂仁一錢。白豆蔻仁半錢。噤感應圓。

初因食一物過傷。得病後再食之。舊病復作。一味紅圓子。常服。

傷食腹痛脹滿。大便不通。遂成食積。小七香圓。一貼用水一盞。姜三片。煎八分。去姜。吞感應圓。

傷食瀉（見大小腸門泄瀉證）

傷於生冷油膩。停滯膈間。脾氣不温。食難消化。或多飡糯食。及一切非時難化之物。並宜紅圓子。金上牢內消圓。

傷食兼感風寒。其證與前同。但添身疼一證。俗謂之夾食傷寒。宜生料五積散。或養胃湯。香蘇飲。和解散。選用。若不瘥。而病入裏者。用瀉。少見諸傷門。傷寒證。食蟹。太過致傷。一味丁香。足以治之。有飲食不節。傷食。以致半身不遂。狀如中風。不可作風治。蓋人之飲食。下咽而入肝。由肝而入脾。由脾而入胃。因食所傷。肝食不理。故痰涎壅塞。若中風。然亦有半身不遂者。肝主筋故也。治以風藥。則悞矣。宜用消食之劑。其中當木瓜散。卻不可妄下之。食毒物、非時物、多病。此不傷脾。不傷胃。而傷肝。病不在下。故不可妄下。

飲食下咽。直入于胃。此云由肝入脾。由脾入胃。必自有說。

祕傳證治要訣卷之三

諸氣門

七氣

七氣致病。雖本一氣。而所以爲氣者。隨證而變。三因方論最詳。喜怒憂思悲恐驚。謂之七氣。所傷有小疾。在咽喉間。如綿絮相似。咯不出嚥不下。並宜四七湯。未效。進丁沉透膈湯。審知是思慮過度。宜四七湯。去茯苓、加半夏如數。仍加石菖蒲人參各半錢。審知盛怒成疾。面色青黃。或兩脇脹滿。宜調氣散。或四七湯。加枳殼木香各半錢。因驚恐得疾。心下憧忡者。見驚悸門。外有七氣眩暈者。當於諸中門、中氣證取藥。

痞塞附噎膈

諸痞塞及噎膈。乃是痰爲氣所激而上。氣又爲痰所膈而滯。痰與氣搏。不能流通。並宜用二陳湯。加枳實礞砂仁各半錢。木香一錢。或五膈寬中散。應諸痞塞脹滿。胸膈不利。或氣上逆。或腹疼痛。並宜木香流氣飲。應膈上諸般冷氣。不問痞塞及疼痛。且與姜汁一二盞。痰飲尤宜。

邪氣作痞。宜用疎劑。若氣不順。逆上爲痞。此乃虛痞。愈疎而痞愈作。宜於收補中。微有疎通之意。不可十分用香劑。古方載瀉後膈痞。用理中。卽此意也

因七氣所傷結滯成疾。痞塞滿悶。宜四七湯。或導痰湯。加木香半錢。或下來復丹。因冷氣滯停中脘。痞塞。並可用撫脾湯。加丁香。或丁沉透膈湯。因傷食痞塞。見諸傷門。傷食證。氣虛上逆。遂成痞塞而疼者。六磨飲。吞黑錫丹。

若痞塞服諸藥不效。大便不甚通者。宜感應丸。加巴豆或半硫丸。備急丸。木香檳榔丸通之。

因怒痞塞。見本門七氣證。諸五噎五膈。並宜五膈寬中散。不效。谷神加禾散。前痞塞諸藥。皆可選用。噎膈甚而水漿不入。藥食皆不下。食入口卽吐者。當鎮墜之。宜鹽湯下靈砂丹。仍以嘉禾散作末。乾點服。

積聚

五臟之積曰五積。六腑之積曰六聚。積有定形。聚無定處。不問何經。並宜十味大七氣湯吞下。尊貴紅圓子。須日數服。木香檳榔去氣積。神麴麥蘗去酒積。蚺蟲水蛭去血積。礞石巴豆去食積。牽牛甘遂去水積。雄黃膩粉去涎積。硇砂水銀去肉積。各從其類也。

有飲癖結成塊。在腹脇之間。病類積聚。用破塊藥多不效。此當行其飲。宜導痰湯。何以知爲飲。其人先曾病瘧。口吐涎沫。漬水。或素來多痰者。是也。

又多飲人。結成酒癖。腹肚積塊。脹急疼痛。或全身腫滿。肌黃少食。宜十味大七氣湯。用紅酒煎服。

肝積在左脇下。狀如覆杯。或如鱉。或嘔逆。或痛。在兩脇牽引小腹。足寒轉筋。久則如瘧。名曰肥氣。宜大七氣湯煎熟。待冷。卻以鐵器燒通紅。以藥淋之。乘熱服。肺積在右脇下。大如覆杯。氣逆背痛。或少氣喜忘。目

瞑膚寒。皮中時痛。如風緣針刺。久則咳喘。名曰息賁。宜大七氣湯。如桑白皮半夏杏仁各半錢。心積起臍下。直至心。大如臂。腹熱咽乾。心煩甚。則吐血。名曰伏梁。宜大七氣湯。加石菖蒲半夏各半錢。脾積在胃脘。大如覆杯。痞塞不通。背痛心疼。饑減飽見。腹滿吐泄。足腫肉消。久則四肢不收。名曰痞氣。宜大七氣湯。下紅圓子。

腎積發於小腹。奔上至心。上下無時。如奔豚走。饑見飽減。小腹急。腰痛口乾。目昏骨冷。久則骨痿。名曰奔豚。宜大七氣湯。倍桂加茴香炒練子肉各半錢。

若腹中似若癖瘕。隨氣上下。未有定處。宜散聚湯。

若氣作痛。遊走於腹間。攻刺上下。隱若雷鳴。或已成積。或未成聚。以全蝎一箇。炒破。煎湯。調蘇合香圓。有正當積聚處。內熱如火。漸漸遍及四肢。一日數發。如此二三日又愈。此不當攻其熱。又有元得熱病。熱留結不散。遂成癥癖。此卻當兼用去熱之劑。

有病癥瘕腹脹。純用三稜莪朮。以酒煨服。下一物如黑魚狀而愈。或加入香附子用水煎。多服取效。又有病此者。用姜蘇湯吞六味圓。六味者。乃小七香圓。紅圓子。小安腎圓。連翹圓。三稜煎。理中員。六件等也。

諸飽氣。並見諸痛門。腹痛證。

腫

腫病不一。遍身腫。四肢腫。面腫。腳腫。方謂之水氣。然有陽水。有陰水。並宜先用五皮飲。升降湯。或除濕湯。加木瓜腹皮各半錢。如未效。繼以四磨飲。兼吞桂黃圓。腫者。總名曰鍾也。寒熱氣所鍾聚也。應陰水、陽水。及蠱脹。服藥外。並宜赤小豆粥佐之。

遍身腫。煩渴。小便赤澁。大便多閉。此屬陽水、輕宜四磨飲。添磨生枳殼。兼進萊菔飲。重則踈鑿飲子。萬靈飲利之。以通爲度。

亦有雖煩渴而大便已利者。此不可更利。宜用五苓散。加木通大腹皮半錢。以通小便。或分心氣飲。

遍身腫。不煩渴。大便自調。或溏泄。小便雖少而不澁赤。此屬陰水。宜實脾飲。小便多少如常。有赤時、有不赤時。至晚則微赤。卻無澁滯者。亦屬陰也。不可遽補。木香流氣飲繼進。復元丹。若大便不溏。氣息脹滿。宜四磨飲。下黑錫丹。

感濕而腫者。其身雖腫。而自腰下至腳重。腿脹滿、尤甚於身。氣或急。或不急。大便或溏。或不溏。但宜通利小便。多服五苓散。吞木瓜圓。間進除濕湯。加木瓜腹皮各半錢。炒蘿蔔子七分半。碾碎之。

有患生瘡。用乾瘡藥太早。致徧身腫。不可妄施他劑。若大便不通。升麻和氣飲。若大便如常。或以自利。當導其氣。自小便導之。宜五皮飲。和生料五苓散。腹若腫。只在下。宜除濕湯。和生料五苓散。加木瓜如澤瀉之類。

有元腎氣根下注。而成腳腫。此當就元頭上治。不可妄以腳氣藥施之。蓋氣入腎。則先腳腫。而後腎疼。腎

氣注。則先腎疼。而後腳腫。五心缺而平。脣腫膚突者。不可治。

病後浮腫。此係脾虛用二分平胃散。一分五苓散。和勻湯調。或生料煎服。或用生料平胃散。加木瓜腹皮人參各半錢。茯苓一錢。或六君子湯。加木香半錢。腫甚者。木香流氣飲。

有渾身水腫。以青蛙一二箇。去皮火炙食之。腫退。亦有單獨腹脹。用亦不効者。

治陽水浮腫。敗荷葉燒存性。碾末。米飲調下。荷葉灰服之令人瘦劣。今假病欲容體瘦以示人者。一味服荷葉灰。故可以退腫。

浮腫之處。若燃熱赤腫而堅。其人或增寒壯熱。或爲癰疽。或遍身生瘡而腫。並見瘡毒門。

四肢腫。謂之肢腫。宜五皮飲。加姜黃木瓜各一錢。或四磨飲。

腳腫見本門腳氣證。

面獨腫。蘇子降氣湯。兼氣急者尤宜。或煎熟去滓後。更磨沉香一呷。

有一身之間。唯面與雙腳浮腫。早起則面甚。晚則腳甚。經云。面腫爲風。腳腫爲水。乃風濕所致。須問其大小腑門通閉。別其陰陽二證。前後用藥。惟除濕湯。加木香腹皮白芷各半錢可通用。或以蘇子降氣湯。除濕湯。各半貼煎之。

蠱脹

蠱與蛊同。以言其急實如蛊。非蠱毒之蠱也。

俗謂之膨脖。又謂之蜘蛛病。所感不同。止是腹大而急。餘處皮肉如常。未辨何證。宜用木香流氣飲。或五苓散。

此病多以積漸而致。或是病後藏氣未復。邪氣乘虛。切不可妄下。氣急者蘇子降氣湯。虛者可用谷神加禾散。加熟附子半錢。佐以復元丹。

若腹內熱急。大便或祕者。宜備急圓。或木香檳榔圓。或用大黃厚朴陳皮枳實。通大便上策。

若因食傷而腹暴脹。見傷門傷食證。

中毒腹脹。權宜用解毒圓。或甘豆湯。

腳氣附下血

風寒暑濕。足常履之。遂成腳氣。諸邪氣。不問久近乾濕。及屬何經。並可用除濕湯。加木瓜檳榔白芷各半錢。或芎芷香蘇散。加赤芍藥草薤各半錢。仍吞木瓜圓。此藥宜常服。腳氣發動。而兩足痛不可忍者。五積散。加全蝎三五箇。入酒煎。

若鶴膝風。則於五積散中。加松木杉木二節。

腳氣發動。必牙痛發熱。不可妄用傷寒等藥。緣腳氣類傷寒。若卒起腳弱。或小腹不仁。或舉體轉筋。或見食嘔逆。或兩頸赤腫。便當作腳氣治。乾者於前二藥中。或更加蘿蔔子炒研碎半錢。濕者於前二藥中。加青橘皮十數片。

切記腳氣不可令下寒。亦不可妄用寒藥。得温則消散。

腳氣跟注一孔。深半寸許。每下半日。疼異常。此乃腳氣注成漏。以人中白於火上煆。中有水出。滴入瘡口。

腳氣發熱不退者。敗毒散。加木瓜一錢。或用敗毒散。五積散。各半貼和勻。名交加散。更加木瓜一錢。

若久履濕而得兩腳或腫或瘡。五苓散下。或和氣飲。加木瓜。蘿蔔子各半錢。大黃一錢。

腳氣小便不通者。生料五苓散一貼。除濕湯一貼。加木瓜二錢。重分二服。若大小便俱不通。五苓散復元通氣散。

腳氣喘急者。此係入腹。宜蘇子降氣湯。或沉香降氣湯。仍佐以養正丹。或四磨飲。

腳氣迫肺。令人喘嗽。宜小青龍湯。每服加入檳榔一錢。重煎服。

腳氣畏食者。宜生料平胃散。加木瓜一錢。嘔逆惡心。八味平胃散。加木瓜一錢。

腳氣日久。腳脛枯細。或寒或熱。或疼或痒。或一腳偏患。軟弱。鱓曳狀如偏風者。宜小續命湯。加木瓜。或獨活寄生湯。附子八味湯。吞活絡丹。虎骨四斤丸之類。腳氣血虛。芎芷香蘇散。內加木瓜。羌活。赤芍藥。如芎芷之類。

腳轉筋。用龍膠散。

腳心痛者。宜大聖散二錢。入木瓜末半錢。一作一錢。豆淋酒調。仍用川椒香白芷草烏。煎湯洗。

孕婦腳腫。枳殼散。詳見婦人門。

陰癇氣

一核偏墜或俱腫脹或一核縮入小腹痛不可忍用手按捺方得還舊是爲癇氣宜蟠葱散吞下茱萸內消丸若未愈華澄茄散下大茴香丸

若大小腑不通宜木香丸半貼以通潤之卻以班貓十箇去足頭翅剉碎同炒去貓出火毒濃煎燈心湯調五苓散下五七十丸或用燈心葱入水酒內煎去燈心葱調五苓散若痛入腹逆上攻心至成嘔逆先用鹽酒下養正丹次用生料五積散加吳茱萸茴香桃仁玄胡索各炒入半錢有因登高攧傷外核以致腫疼或小便出血或小便不通宜五苓散和復元通氣散服

有陰癇大如斗諸藥不能効者宜當歸四逆湯加生姜茱萸戴復菴曾用之効

手氣

手氣手腫痛或在掌指連臂膊並五痹湯瀉痹湯

小腸氣

氣因寒聚爲疝血因寒聚爲瘕即是疝氣今謂之橫弦竪弦繞臍走注小腹疼痛宜蟠葱散吞下茱萸內消丸或鹽酒調異攻散

不問何證皆可用生料五苓散加炒茴香半錢或一錢服藥未効大痛攻刺不已陰縮手足厥冷宜香附子炒鹽乘熱用絹裹熨臍下若大小腑不甚通者五苓散加桂下青木香丸

初發或頭疼身熱。或增寒壯熱。並宜參蘇飲。加木香。有逆上攻心。下不覺痛。而見心疼者。宜以生韭搗取自然汁。和五苓散爲丸。茴香湯下。亦於心痹疼證中互言之。有腎氣纔動。心氣亦發。上下俱疼者。宜異攻散。吞茱內消丸。或且專治下。下痛定。則上痛定矣。

有腎氣逆上。痰涎壅塞。迷悶。宜腎逆散。吞養正丹。凡人忽患胸背手足、頸項腰胯、痛不可忍。連筋骨牽引吊痛。坐臥不安。走易不定。俗醫不曉。謂之走注。用風藥及針灸。非也。又疑風毒結聚。欲成癰疽。妄以藥貼。亦非也。或頭痛不可舉。或神意昏倦。多睡。或飲食無味。痰唾稠粘。夜間喉中如鋸聲。多流涎唾。手足重墜痹冷。脉不通。誤認爲癱瘓。亦非也。凡此乃是痰飲頑涎。伏在心膈上下。變爲此疾。於後停飲伏痰中選擇

祕傳證治要訣卷之四

諸血門

鼻衄

鼻通於腦。血上溢於腦。所以從鼻而出。凡鼻衄。並茅花湯調止衄散。時進折二泔。仍令其以麻油滴入鼻。或以蘿蔔汁滴入亦可。茅花白芍藥對半尤穩。

諸失血而發熱甚者。難治。十僅可一二全者。

有頭風纔發。則自衄不止。宜芎附飲間進一字散。

有因虛致衄。此爲下虛上盛。不宜過用涼劑。宜養正丹。及紫霞丹。仍佐以四物湯。芎歸湯。磨沉香服。

傷濕而衄。腎著湯加川芎名除濕湯。

傷胃致衄者。名爲酒食衄。擷撲致衄者。名爲折傷衄。外喜怒憂思諸氣。皆能動血。以此致衄者。名五臟衄。上膈極熱而衄者。金沸草散去麻黃半夏。加茅花如荊芥數。或用黃芩芍藥湯。加茅花一撮。虛極者。伏苓補心湯。

飲酒過多。及食熱物而衄。先用茅花湯。衄愈甚。則理中湯加乾葛川芎各半錢。或止川芎。不必乾葛。或於

理中湯去乾姜。用乾葛。或只依本方。幷芎不必加。或止用乾姜甘草二味。

攧而衄不止。蘇合香丸一圓。或以小烏沉湯一錢。白湯調下。或煎濃蘇湯。獨調小烏沉湯。或添入黑神散一錢。隨湯調下。亦得仍驀然以水噴其面。使載驚則止。小烏沉濃蘇湯調。非特攧而衄。而五竅出血皆治。不因攧而衄者亦治。諸竅血。皆可以水沃嘿驚則血止。

曾病衄愈後。血因舊路。一月或三四衄。又有洗面而衄。日以爲常、此卽水不通借路之意。並宜止衄散。茅花煎湯調下。或四物湯加石菖蒲阿膠蒲黃各半錢。煎熟、調火煆石膏末一匙頭許。兼進養正丹。前諸證、服不效。大衄不止者。養正丹多服。仍佐以蘇子降氣湯。使血隨氣下。

衄後頭暈。四物湯。或芎歸湯。十全大補湯。

伏暑而衄者。茅花湯調五苓散。伏暑吐血者。亦治。有先因衄血。衄止而變生諸證。或寒熱間作。或喘急無寐。病狀不一。漸成勞憊。當於虛損諸證詳之。後吐血同上治法。

舌衄

舌衄。槐花爲末。摻之。或麥門冬煎湯。調妙香散。

肌衄

血從毛孔而出。名曰肌衄。以男胎髮燒灰。敷之。

牙宣即齒衄

牙宜有二證。有風壅牙宜。有腎虛牙宜。風壅牙宜。消風散擦之。仍服腎虛牙宜。以腎主骨。牙者骨之餘。肺而上炎。故宜服涼劑而愈甚者。此屬腎經下虛上盛。宜鹽湯下安腎丸。間黑錫丹。仍用薑鹽炒香附。黑色爲末。揩擦。其妙不可言也。

吐血

吐血者。血溢入濁道。留聚膈間。滿則吐血。名曰內衄。宜蘇子降氣湯加人參阿膠各半錢。下養正丹。濕溢血傷。能令吐血。腎著湯加川芎名除濕湯。此乃濕毒鬱於經絡。血溢妄行。從鼻則衄。衄行清道。吐行濁道。流入胃脘。令人吐血。妄行於上。或吐。或咯。或嗽。用琥珀効者。固多有之。宜擇末藥中入此一味。或煎藥去滓。可調服。

一吐血咯血。炒棕苴粉。和小烏沉湯。白湯點服。吐血不止者。菜頭搗汁呷之。咯血者。每日空心進一二呷。

入側柏一兩。沙參一兩。焙研末。入飛麵二錢。調如稀糊啜服。

上膈壅熱吐血。四物湯加荊芥阿膠各半錢。更不止。於本方中加大黃滑石各半錢。或降氣湯。吞木香檳榔丸。從大便導之。此實熱則可。虛勞則不可。

吐甚頭暈。發爲寒熱者。降氣湯加四物湯各半貼。加阿膠一錢。若單單發熱者。茯苓補心湯。

胃傷吐血。宜理中湯。加川芎乾葛俱各半錢。或只依理中本方。加川芎扁豆尤好。不必乾葛。若渴甚。用葛。

打損惡血。滲入胃中。以致吐血。宜先進蘇合香丸。仍以黑神散。和小烏沉湯。童便調治。夏月伏暑吐血。芽

花湯調五苓散。有因勞力太過。吐血不止。蘇子降氣湯。加人參半錢煎。有時或吐血兩口。隨即無事。數日又發。經年累月不愈者。宜黑神散。和小烏沉湯常服。吐血人多發渴。名爲血渴。四物湯。十全大補湯。量胃氣虛實用之。吐血後。血止而變生諸證者。見衄血證。

咯血

咯血。不嗽而咯出血也。初得病。且宜白扁豆散。加入生地黃藕節各半錢。尤佳。及濃磨京墨。調黑神散。小烏沉湯各一錢。或新掘生地黃。淨洗。生姜少許。搗汁去滓。溫進。又有以生姜一片。四面醮百草霜含嚥。如百草霜已淡。吐出再醮。如姜已無味。則吐出易之。嗽血亦治。

勞瘵。吐咯血。七珍散。加阿膠當歸各半錢。惡甜人。更加百藥煎半錢。仍調鍾乳粉尤佳。一味鍾乳粉。用糯米飲調。吐血嗽血亦治。因飽屈身。傷肺吐血者。白茯枇杷丸。或白茯蓮須散。

嗽血 附肺癰

熱壅於肺。能嗽血。久嗽損肺。亦能嗽血。壅於肺者易治。不過涼之而已。損於肺者難治。已久成勞也。熱嗽有血者。宜金沸草散。加阿膠半錢。勞嗽有血者。宜補肺湯。加阿膠白茯各半錢。嗽血而氣急者。補肺湯加阿膠杏仁。桑白皮各半錢。吞養正丹。或靈砂丹。或三砂丹。間進百花膏。嗽血肺損。薏苡仁十兩。杵碎。水三升煎。取一升。入酒少許。分二三次服。或以薏苡仁研細末。煮豬肺。白醮食之。豬心一箇。竹刀切開。勿令相離。以沉香末一錢重。半夏七箇。入在縫中。紙裹、醮小便內。令濕。煨熟取出。去半夏。只吃豬心。此方嗽血吐

血均治。熱嗽咽疼。痰帶血絲。或痰中多血。其色鮮者。並宜金沸草散。若服涼劑。不愈。其色瘀者。此非熱證。宜杏子湯。肺癰爲病。胸痛喘滿。咯嗽濃血。腥臭異常。久則唾出如粥。或口燥咽乾。皆由肺氣不通。以致熱血凝滯蓄結。宜千金內補散。去官桂、和補肺湯半貼。煎服。或金沸草散。去麻黃加桔梗如數。或更加桑白皮。枇杷葉。仍用杏仁去皮尖生研成膏。入百藥煎末。圓如彈子大。含化四和膏亦可。

小便血（見大小腑門本證。）

痛者爲血淋。不痛者爲尿血。血淋別見後大小腑門。淋閉證。尿血先與生料五苓散。和四物湯。若服藥不効。其人素病於色者。此屬虛證。宜五苓散和膠艾湯。吞鹿茸圓。或附子八味圓。或辰砂妙香散。加五苓散。吞二項圓子。若小便自清。後有數點血者。五苓散加赤芍藥一錢。亦有如砂石色紅、卻無石淋之痛。亦屬虛證。宜五苓散和膠艾湯。或五苓散和辰砂妙香散。吞鹿茸圓。八味圓。玉蓯腫痛。其證不一。有通身水氣。癩蓯俱腫者。此當求之諸氣門、水腫氣證。以治水之法。腎風痒。抓搔過傷。以致腫疼。此當求之瘡毒門。癩風證。癩風愈則腫自消。有妬精饞瘡。用乾瘡之藥太緊。毒氣未散。蘊結成腫。有服金石祕澁之劑。精氣壅遏。不能宣揚。或試緊爐之方。取一時之快。不知熱毒反着自身。俱能爲腫。有血氣凝滯。陰癩。閒竅道閉塞。致使蓯腫。近俗戲名吹大。或緣忍溺而得。下三證。並宜燈心湯調五苓散。服餌以滌其內。荊芥甘草木通。煎湯淋洗。以宣其外。

淋痛。五淋者。血石氣膏勞是也。血淋。溺中有血。石淋。溺中有砂石之狀。其溺於盆也有聲。此卽是精氣結

成砂石以溺俱出氣淋氣鬱所致小腹有若膀胱氣之狀膏淋溺與精混或沉在澱下如糊狀或浮在澱上如脂膏狀勞淋病在多色下元虛憊清濁不分腎氣不行鬱結而爲淋或勞心過度火不得其養小腸爲心之腑臟病而腑與俱病或心腎不交腎之不温津道閉塞或出汗大過或失血太多津道欲枯竭皆成勞淋五者得名而不及熱與冷何哉蓋五者皆有冷有熱血有熱血有瘀血氣有熱氣有冷氣勞有虛冷有虛熱若與湯藥過差精不由其道妄行不禁與溺俱出此乃熱劑之傷未可槩以爲冷也

治淋之法除的然虛冷之外其餘諸證若用本題藥不効便宜施以調氣之劑蓋津道之逆順皆一氣之通塞爲之也如木香流氣飲卻爲的當其中自有木通麥門冬腹皮輩比如不効但宜投以益血之方蓋小便者血之餘也血苟充滿則滋腴下潤自然流通如火府丹自卻爲的當其中有地黄輩然此非特言血淋氣淋一應淋皆可用獨不可用之虛冷耳淋病小便之色多是見赤未可便以赤爲熱氣道蘊結故如此爾

便血不止者用松楊柿一箇燒存性研末米飲調下即愈

破傷血見瘡毒類撲證

大便血見大小腑門本證

瘡毒血見瘡門本證

祕傳證治要訣卷之五

諸痛門

頭痛

諸頭痛有因氣因痰因虛及外感四氣或酒食所傷或作勞失力以致頭痛不問何證疑似之際並可與如聖餅子烏芎湯外有臭毒頭痛一味吃炒香附愈荊公解痛字義云宜通而塞則爲痛

有偏正夾腦風服川烏附不愈用蓮子草烏而愈者此乃毒攻毒之意不可不知

有上焦熱頭痛宜敗毒散去柴胡加甘菊花如其數有頭風暈眩不可謂其無痛而不以爲風切宜詳審未宜遽作虛治若投補劑愈甚別又無疾所失血等患又非諸般病後卒然得此是風暈分曉宜小續命湯加全蝎三四箇

有頭風發動頂後兩向筋緊吊起作痛者看其人挾寒挾虛宜大三五七散

頭風用熱藥者多間有挾熱而不勝熱劑者宜消風散通關散茶調散清上之類偏正頭風作痛痛連於腦常如牽引之狀發則目不可開眩暈不能擡舉宜芎辛湯每服加全蝎五箇間進太陽丹及如聖餅子或用大茶調散八生散追風散大三五七散覺上腦有熱大茶調散并一字散

痰作頭痛。其人嘔吐痰多者。宜芎犀湯。或芎辛湯去茶牙。導痰湯。加芎半錢。八生散。亦可用。有病此、發作無時。俗名痰飲頭風。氣不順。停痰上攻頭痛。順氣爲上。二陳湯。導痰湯。並有加料法。

頭痛挾熱。項生磊塊作痛。宜都梁丸。

有爛頭風。痒而痛者。於服頭風藥外。用烏醋磨鐵銹塗。生姜汁。亦可揩擦。

怒氣傷肝。及肺氣不順。上衝於腦。令人頭痛。宜沉香降氣湯。幷蘇子降氣湯。下養正丹。或用芎附飲。

因虛頭痛。此爲腎厥頭痛。宜用正元散。或大三五七散。入鹽煎服。或於正元散。入炒椒十五粒。下來復丹。間進黑錫丹。有服諸藥不効。其痛愈甚。宜茸硃丹。所以用茸者。已於虛損門、眩暈證詳論之。

感風寒暑濕四氣。及傷食頭痛。見諸傷門。

中酒頭痛。見諸傷門酒食證。

作勞失力頭痛。見本門身體痛證。頸痛、因頭痛牽引致痛者。當於頭痛諸證中求藥。若別無處。獨在頸者。非是風邪。卽是氣挫。亦有落枕而成痛者。並宜和氣飲。食後服。

眼眶骨痛 附眉稜痛

痛有二證。眼屬肝。有肝虛而痛。纔見光明。則眶骨痛甚。宜生熟地黃丸。又有肝經停飲一證。發則眉稜骨痛。眼不可開。晝靜夜劇。宜導痰飲。或芎辛湯去茶牙。或二陳湯。吞青州白丸子。併於痰飲選藥。

牙痛

牙痛。有風毒熱壅齲蛀。腎虛。未辨何證。俱用消風散揩抹。諸證俱宜香附炒黑三分。炒鹽一分。研均揩用如常。

風毒牙疼。用皂角寸節。實之以鹽。火煨熟。湯泡通口。嗽吐下涎沫。風毒及熱壅上攻。牙齦痛。或齒縫有紅肉脅出。宜消風散。食後臨臥入茶點。仍入荊芥防風白芷蜂房之屬。煎冷頻頻漱口。

有牙蟲已出。其孔穴空虛而痛者。此乃不可不知。宜用乳香少許。火炙令軟。以實之。

若熱壅甚。牙腫連頰。疼不可忍。宜金沸草散。去麻黃。加薄荷如其數。

腎虛牙浮而痛甚。則增寒壯熱。全具如欲脫之狀。宜安腎丸。間進黑錫丹。

蛀痛。用巴豆一粒。爛研。搓乳香細末丸之。塞蛀孔中。

咽喉痛 附上壅

傷寒咽喉痛。有陰陽二證。已於諸傷門、傷寒證詳言之。今止言諸雜病咽痛。宜甘桔湯。熱毒上攻。或有瘡。或無瘡。服甘桔湯不効者。宜於甘桔湯、加荊芥一錢半重。名如聖湯。或如聖湯中。更加連翹一分。防風半分。或甘露飲。仍用碧雲散。旋旋煎點。間用鹽水吞養正丹。兼以薄荷煎鷄蘇丸含化。

有咽疼。服冷劑反甚者。宜用姜汁。詳見嗽門熱嗽證矣。

有內熱。熱形於上。焦以致咽疼。宜用黃柏皮。黃連。大黃研末。水調。塗在心與患處。此出於葉氏方書。

熱壅咽痛。或嗽中帶血者。宜金沸草散。佐以辰砂化痰丸。咽喉痛。用諸冷藥不効者。宜枳南湯。

喉痹作痛。腫滿不能言。咽中生物。名喉風。宜甘桔湯。若熱壅上焦。咽喉疼痛。而吞嚥乾物。不若常時之潤。睡覺口舌全無津液者。如聖湯加人參半錢。玄參七分。或佐以碧雲散。鷄蘇丸。有上證兼心頭煩燥。辰砂五苓散。凡上壅並宜縮砂殼、燒灰存性。研末、水調服之。

膈痛附心痞

多因積冷與痰氣而成。宜五膈寬中散。或四七湯加木香桂各半錢。或撏脾湯加丁香。膈痛而氣上急者。宜蘇子降氣去前胡。加木香如數。

痰涎壅盛而痛者。宜小半夏茯苓湯加枳實一錢。間進半硫丸。

心痞有痰飲所致。俗名飲痞。有胃口熱。食易消。故痞。素問謂之食痞。亦類消中之狀。俗名肚痞。痰氣宜小半夏茯苓湯加枳實一錢。胃中熱。宜二陳湯加黃連一錢。或五苓散、加桂與辰砂。

膈痛與心痛不同。心痛則在岐骨陷處。本非心痛。乃心支別絡痛耳。膈痛。則痛橫滿胸間。比之心痛爲輕。痛之得名。俗爲之稱耳。諸方稱爲嘈雜煩躁。悒悸。痰飲證也。五苓散、利心小腸之熱。恐非其對。不若用四物湯。十全大補湯。去桂生血而益陰。此亦非水制火之義。亦有病痞。呷姜湯數口。或進乾姜劑而愈。此膈上停寒。中有服飲。見半熱則消。

臂痛

臂爲風寒濕所搏。或飲液流入。或因提挈重物。皆致臂痛。有腫者。有不腫者。除飲證外。其餘諸痛。並宜五

積散及烏藥順氣散或蠲痹湯
外有血虛一證血不榮於筋或致臂痛宜蠲痹湯四物湯各半貼和勻煎服
乳婦如臂枕兒傷於風寒多有臂痛亦宜於此選用若坐臥爲風濕所搏或睡後手在被外爲寒邪所襲遂令臂痛宜五積散及蠲痹湯烏藥順氣散審知是濕蠲痹湯每服加蒼朮三匙防己四分或用五痹湯曾因挈重傷筋以致臂痛宜琥珀散趺勞散或和氣飲每服加白姜黃半錢以姜黃能入臂故也
飲流入臂見諸嘔門停飲伏痰證
肩背痛
肩背痛未辨何證俱宜和氣飲每服加烏藥半錢
當肩背一片冷痛背膂疼痛古方用神保丸愈者此有積氣故也
其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯下五套丸更於嘔吐門停飲證選藥
有腎氣不循故道氣逆挾背而上致肩背作痛宜和氣飲每服加炒茴香半錢炒水椒十粒
有本體虛及病後心膈間痛或牽引乳脇或走注肩背此乃元氣上逆當引使歸元不可復下疎刷之劑愈刷愈痛發汗大多人患此者衆惟宜温補拘於氣無補法之說誤矣經云汗者心之液又曰陽受氣於胸中汗過多則心液耗陽氣不足故致疼也
心脾痛

有近方得病者有病得之已久時發動者不問諸證並宜異攻散香靈湯仍佐以撝脾湯若積冷而痛者宜手粘散酒調下於內加官桂等分仍以撝脾湯鐵刷湯佐之或用蘇合香圓姜汁和酒調開熱服前後心疼亦可用若服温藥不効者痛愈甚宜微利其大便量虛實先進神保丸以利爲度繼進加味七氣湯若因飲食冷物而痛者宜調氣散和撝脾湯若因蚘作痛蚘攻嘔心痛有休止其人吐蚘或與之湯飲藥餌轉入轉吐蓋緣物入則蚘動蚘動則令人惡心而吐用川椒十數粒煎湯下烏梅丸有腎氣逆上攻心以致心痛用生韭研汁和五苓散爲丸空肚茴香湯下

脇痛

諸脇痛各有所感若止是冷氣作楚與攔撲閃挫宜和氣飲及烏藥順氣散或濃煎葱白湯下枳殼散左右脇有氣塊而痛者此是積聚見諸氣門積聚證停飲脇痛本事方而丸最佳曾有人脇痛連膈進諸氣藥并自大便導者其痛殊甚後用辛熱補劑下黑錫丹方愈此乃虛冷作痛愈疎而愈虛耳脇痛病在肝膽傷寒脇痛屬少陽經合用小柴胡湯痛甚而不大便者於內加枳殼若尋常脇痛不係正傷寒時身體帶微熱者本事方中枳殼煮散用枳殼桔梗細辛芎防風各四分乾葛錢半甘草一錢若只是脇痛別無雜證其痛在左爲肝經受邪宜用川芎枳殼甘草其痛在右爲肝經移病於肺

宜用片姜黃枳殼桂心甘草。此二方出嚴氏濟生續集。加減在人。又有肝膽經停痰伏飲。或一邊脇痛。宜用嚴氏導痰湯。痰結成癖。間進半硫丸。蓋枳殼乃治脇痛的劑。所以諸方中皆不可少。曾見潘子先說有人脇痛。下青龍湯痛止。兼嗽得可。此其痛必在右脇故也。灼然知是寒氣作痛。枳實理中湯爲宜。戴復菴云。腹內諸般冷痛。一箇枳實理中湯加減作無限用。

腰痛

腰者。腎之所附。皆屬腎有寒有濕。有風有虛。皆能作痛。有閃挫勞役而痛者。宜生料五積散。加炒桃仁五枚。

腰痛如鋸刀所刺。大便黑。小便赤黃或黑。由血滯腰間。名瀝血腰痛。桃仁酒調黑神散。

若寒腰痛。見熱則減。見寒則增。宜五積散。每服加吳茱萸半錢。

若濕腰痛。如坐水中。蓋腎屬水。久坐水濕處。或爲雨露所着。濕流入腎經。以致腰痛。宜滲濕湯。不効。宜腎着湯。

若風傷而腰疼者。或左或右。痛無常處。牽引兩足。宜五積散。每服加防風半錢。或加全蝎三箇尤好。小續命湯。獨活寄生湯。皆可選用。仍吞三仙丹。杜仲姜汁炒研末。每一錢溫酒調。空心服。名杜仲酒。治腎虛腰疼。兼治風冷爲患。

婦人血過多。及素患血虛致腰痛者。當益其血。見婦人門。若腎虛腰痛。轉側不能。嗜臥疲弱者。大建中湯。

加川椒十粒。吞下腰腎圓。及生料鹿茸圓之類。仍以茴香炒研末。破開諸腰子。作薄片。不令斷層層摻藥。濕水紙裹。煨熟細嚼酒嚥。

若因閃肭。或攔撲傷損而痛。宜黑神散。和復元通氣散。酒調下。不効。則恐有惡血停滯。宜先用酒調下蘇合香圓。仍以五積散。每服加大黃半錢。蘇木半錢。當歸倍元數。若因勞役負重而痛。宜用和氣飲。或普賢正氣散。

腹痛

腹痛之痛。所感不一。或因寒熱。或因暑濕。或因飲食饑飽。不問何證。皆可用藿香正氣散。加木香半錢。或正氣散。調化蘇合香丸。

若脹痛欲得熱手按。及喜熱食者。此是積冷作痛。當用理中湯。或治中湯。小建中湯等藥。若冷痛。用温藥不効。痛愈甚。大便不甚通。當微利之。用藿香正氣散。每服加官桂木香枳殼各半錢。吞下來復丹。或用蘇感丸。不利。則量虛實用神保丸。

有全不喜食。其人本體素怯弱而又加以腹冷疼者。養胃湯。以白朮蒼朮。仍加桂茱萸各半錢。木香三分。應腹冷痛。或心脾疼者。生姜均治之。

祕傳證治要訣卷之六

諸嗽門

嗽證

古人云臟腑皆有咳嗽。夫嗽屬肺。何爲臟腑亦皆有之。蓋咳嗽爲病。有自外而入者。有自內而發者。風寒暑濕外也。七情饑飽內也。風寒暑濕。先自皮毛而入皮毛者。肺之合。故雖外邪。欲傳臟腑。亦必先從其合而爲嗽。此自外而入者也。七情饑飽。內有所傷。則邪氣上逆。肺爲氣出入之道。故五臟之邪。上蒸於肺而爲嗽。此自內而發者也。然風寒暑濕。有不爲嗽者。蓋所感者重。徑傷臟腑。不留於皮毛。七情亦有不爲嗽者。蓋病尙淺。止在本臟。未卽上攻。所以傷寒以有嗽爲輕。而七情饑飽之嗽。久而復見。凡諸嗽未審內外所感。並宜二陳湯加杏仁五味(乙作)人參各半錢。重飲水一二口而暫止者。熱嗽也。呷熱湯而暫停者。冷嗽也。治熱嗽以小柴胡湯加五味。冷嗽理中湯加五味。皆已試之驗。此出醫餘。

諸嗽皆可佐以應夢觀音散。而加喘者。以此於食前吞下養正丹。

壅嗽聲重痰涎。或咳有血。以薄荷生胡麻各一撮。細嚼。煎蘇子降氣湯送下。

感風而嗽者。惡風有汗。或身體發熱。或鼻流清涕。桂枝湯加人參杏仁五味各半錢。

應嗽多汗體虛而又不勝熱藥者橘蘇散。

感寒而嗽者惡風無汗或身體發熱或鼻流清涕宜杏子湯。

若風寒俱感而嗽者或惡風無汗或惡風有汗頭痛身疼塞鼻薰眼涕疾稠黏者小青龍湯以上三藥傷寒太陽經有嗽者皆可用。

感暑而嗽者自汗煩渴或帶寒面垢六和湯加五味子一錢。

感濕而嗽者身體痛重或汗或小便不利此多乘熱入水或冒雨露或浴後不解濕衣致此宜白朮湯。

熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且濃或帶血縷或帶血腥臭或堅如蠣肉不若風寒之嗽痰清而白宜金沸草散仍以辰砂化痰圓或薄荷煎八風丹含化熱嗽於金沸草散中加五味杏仁茯苓足成十品入棗子一箇同煎功效尤勝名旋覆湯。

有熱嗽諸藥不效竹葉石膏湯去竹葉入粳米少加知母多加五味杏仁此必審是伏熱在上焦心肺間可用。

有熱嗽失聲咽痛多進冷劑而聲愈不出者宜以生薑汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷熱嗽後失聲者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有之宜審其證用藥佐以橄欖圓含化仍濃煎獨味枇杷葉散熱服。

冷熱嗽因增減衣裳寒熱俱感遇午寒亦嗽午熱亦嗽飲熱亦嗽飲冷亦嗽宜金沸草散消風散各一貼

和煎。或應夢人參散。或款冬花散。二母散。仍以辰砂化痰圓。八風丹。或四和圓。舍化。七情饑飽嗽。無非傷動臟腑正氣。致邪上逆。結成痰涎。肺道不理。宜順爲先。四七湯半貼。加桑白皮杏仁五味子人參阿膠各半錢。

有嗽血痰。與食俱出者。此蓋飲食失節。致肝氣不利。而肺又有客邪。肝濁道。肺淸道。淸濁相干。宜二陳湯加木香杏仁細辛枳殼各半錢。

有飲冷熱酒。或飲冷水。傷肺致嗽。俗謂之湊肺。宜紫苑飲。勞嗽。有久嗽成勞者。有因病勞久嗽者。其證寒熱往來。或濁熱無寒。咽乾嗌痛。精神疲極。所嗽之痰。或濃。或時有血腥臭異常。語聲不出者。補肺湯半貼。加杏仁貝母款冬花阿膠百合各半錢。煎去渣。調鍾乳粉。咽痛者。更加桔梗半錢。熱甚者。更加秦艽半錢。嘔者。去地黃。加半夏如其數。氣急者。加靈砂丹。或三炒丹。

經年累月久嗽不已。服藥不瘥。餘無他證。卻與勞嗽不同。宜三拗湯。仍佐以靑金丹。

脾胃如常。飲食不妨者。加味人參淸肺湯。參粟湯。有暴嗽。服藥不効者。或教之進生料鹿茸丸。大菟絲子丸。方愈。此乃腎虛所致。有本有標。卻不可以暴嗽爲疑。遽補之非。然所以易愈者。亦覺之早故也。

嗽而有血。見諸血門。嗽血證。

時行嗽。發熱惡寒。頭痛鼻塞。氣急。狀如傷冷。熱。連咳不已。初得病。卽伏枕一兩日卽輕。記壬午秋。滿城有此病。繼時甲午年。夏秋之交。此病又自南而北。得免者少。並呼爲蝦蟆瘟。用參蘇飲。加細辛半錢。

哮喘

喘氣之病。哮吼如水鷄之聲。牽引胸背。氣不得息。坐臥不安。此謂嗽而氣喘。或宿有此根。如遇寒暄則發。一時暴感。並於前嗽藥中。加桑白皮。則續加仍吞養正丹。間進青金丹。風寒喘嗽。宜九寶湯。若乾喘不嗽。不分久遠近發。宜蘇子降氣湯。或神祕湯。吞養正丹。重則四磨飲。或六磨飲。吞靈砂丹。或應夢觀音散。吞養正丹。尤宜。

喘而服藥不効者。利導之。宜神保丸。大便已溏者。不可用。

不嗽而氣自急。有二證。須用分別。有外邪迫肺而氣急者。病初得。氣不急。必兼外證。此謂之喘。若用耗氣除邪之藥。則元氣愈脫。而氣愈上奔矣。宜於虛損門氣急痰證求之。氣急而膈間更有刺痛處。宜分氣飲。治嗽與喘。用五味爲多。但五味有南有北。生津止渴。潤肺益腎。治勞嗽者。宜用北五味。若風邪在肺。宜用南五味。不若二者兼用。

嘔吐 附惡心

嘔與吐之辨。已於傷寒論之。然證亦不一。有寒嘔。有熱嘔。氣嘔。痰嘔。吐食嘔。吐血。吐蚘。惡心。乾嘔。除熱嘔吐血外。近世嘔吐二字。皆通用。然卻無甚利害。理亦自不妨。並小半夏茯苓湯。或二陳湯。或理中湯。多加生姜煎。生姜嘔中之聖藥。大痛色如青菜葉者死。

寒嘔。中脘停寒。飲食喜辛熱物入口。卽吐出。宜二陳湯。加丁香十粒。或理中湯加枳實半錢。不效。則溫中

湯。甚則附子理中湯。或丁附湯。並須冷服。蓋冷遇冷則相入。庶不吐出。有痰飲。粥藥到口即吐。人皆謂其翻胃。非也。此乃痰氣結在咽膈之間。宜先以姜蘇湯下靈砂丹。俟藥可進。則以順氣之藥繼之。

外有吐瀉及痢疾。或腹冷痛。進熱劑太驟。以致嘔逆。宜二陳湯加砂仁白豆蔻各半錢。甚則入沉香少許。

寒熱氣食痰血六嘔。外有漏氣走哺。漏氣者。上焦熱。食必先吐。而後下。汗出身胃熱。走哺者。下焦熱。氣逆不續。大小便不通。嘔吐不禁。

熱嘔。見諸傷門。傷寒嘔吐證。凡進熱藥愈增者。當於寒嘔中求。熱嘔宜二陳湯加黃連一錢。氣嘔。胸滿膈脹。關格不通。不食常飽。食則常氣逆而吐。此因盛怒中飲食而然。宜二陳湯加枳實木香各半錢。或吳茱萸湯。不効。則丁沉透膈湯。及五膈寬中湯。

食嘔。多因七情而得。有外感邪氣。幷飲食不節而生。大槩治以理中爲先。二陳湯加枳實一錢。或加南星七分。沉香木香各四分。亦好。或只服枳南湯。或導痰湯。

又有中脘伏痰。遇冷即發。俗謂之冷癇。或服新法半夏湯。或抓脾湯。外有熱痰而嘔者。宜小半夏茯苓湯加竹茹如錢大。若嘔痰而或致厥者。乃寒痰逆悶。謂之痰厥。宜姜附湯。以生附代熟附。

吐蚘。乃胃寒所生。經云。蚘者長蟲也。胃中冷則吐蚘。成蚘厥。宜理中湯加炒川椒五粒。檳榔半錢。吞烏梅丸。惡心乾嘔。欲吐不吐。心下映漾。人如畏舡。宜大半夏湯。或小半夏茯苓湯。或理中湯。治中湯。皆可用。

嘔吐。諸藥不効。當借鎮重之藥。以墜其逆氣。宜姜蘇湯下靈砂丹。須百粒作一服。俟藥得効。卻以養正丹。

半硫圓導之嘔吐津液既去其口必渴不可因渴而遽以爲熱又有嘔吐諸藥不効又別無前項痰氣等證乃蚘在胸膈作嘔見藥則動動則不納藥藥出而蚘不出雖非吐蚘之比亦宜用吐蚘藥或於治嘔藥中入炒川椒十粒蚘見椒則頭伏故也曾有患人用附子理中湯四逆湯加丁香到口卽吐後去乾姜只參附加丁木二香煎熟更磨入沉香藥立吐定蓋虛痰氣凝結丁附既温佐以沉木香則通乾姜白朮則泥耳

吐血見血門

停飲伏痰

飲凡有六懸澄交痰留伏痰飲特六飲之一耳人病此而止曰痰飲者蓋停飲既久未有不爲痰多因氣道閉塞津液不通譬如溝渠壅遏積淹停滯則倒流逆上痰濁臭穢無所不有若不疎決溝渠而欲澄治已壅之水而使之清無是理也

凡爲喘爲咳爲嘔爲泄爲眩爲暈心嘈怔忡驚悸爲寒熱痛腫爲痞膈爲壅閉或胸脇間轆轤有聲或背心一片常如水冷皆飲食所致此卽如水之壅有瘀濁臭穢故善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣並宜蘇子降氣湯導痰湯各半貼和煎或小半夏茯苓湯加枳實木香各半錢吞五套圓或以五套圓料依分兩作飲子煎服尤好平居皆無他事只有痰數口或清或堅宜二陳湯小半夏茯苓湯痰多間進青州白圓子和來復丹服來白圓如和以八神來復丹卽名青神圓此非特治痰飲尤

甚療噦、嗽、嘔吐、逆、翻胃。若服藥未効者。二生湯加木香半錢。若頑涎隨氣逆上。不爲藥解。當自下部利之。宜五膈寬中散。加半夏半錢。呑破飲圓。仍佐以半硫圓。恐大便復祕飲利不盡。半硫圓當常服。若大便先不因藥自利。及老人虛人。當利其小便。宜小半夏茯苓湯。改用赤苓而倍之。或導痰湯加猪苓半錢。痰飲暈眩。及成飲厥者。宜別加木香二生湯呑青州白圓子。和靈砂丹。名青令丹。或呑養正丹。半硫圓。痰飲流入四肢。令人肩背痠疼。兩手軟痹。醫誤以爲風。則非其治。宜導痰湯加木香姜黃各半錢。病痰飲而變生諸證。不當爲諸證牽掣。妄言作名。且以治飲爲先。飲消則諸證自愈。有卒然昏悶。口眼喎斜。似中而實非中。四肢戰曳。身如浮雲。似虛而實非虛。皆痰飲所爲也。又有腎虛寒。不能攝水。致邪水溢上。故作痰飲。宜八味圓。

翻胃

翻胃之病。所以重於嘔吐者。嘔吐食入卽吐。翻胃則或一日半日。食復翻上。不化如故。腹中非不欲食。不肯留。胃氣不温。不能消食。食既不消。不爲糟粕。而入大腸。必隨氣逆上。從口而出。故翻胃人。胸膈多爲冷氣所痞。二陳湯加丁香十粒。枳殼半錢。或治中湯加枳殼砂仁各半錢。半夏一錢。入米與生姜同煎。若胃寒甚。服藥而翻者。宜附子粳米湯加丁香十粒砂仁半錢。大便祕者。更加枳殼半錢。若胸膈痞甚而翻。宜谷神嘉禾散。生附一錢。或丁沉透膈湯。五膈寬中散。加生附一錢。仍以來復丹。升降其陰陽。通其隧道。半硫圓亦可通之。隧道久不通。名結腸翻胃。半硫圓尤宜。百藥無効。勢危篤者。宜桂香

青金散以墜之。一法。用胡椒一味。醋浸之。曬乾。醋浸不計徧數。愈多愈好。碾末醋糊爲圓。淡醋湯下十圓。加至三四十丸。

不喜食

脾運食而傳於肺。脾氣不足。故不喜食。宜啓脾丸。養朴丸。若脾虛而不進食者。當實脾。宜鹿茸橘皮煎丸。若脾冷甚而不進食者。理中湯。未効。附子理中湯。加砂仁半錢。或丁香煮散。心腎虛。致脾氣不足以運者。鹿茸橘皮煎丸。脾上交於心。下交於腎者也。

噫氣吞酸

吞酸者。宿食所爲。故曰中脘有飲。嘈有宿食。則酸。噫氣吞酸。噯宿腐氣。逆噦酸水。亦有每晨吐清酸水數口。日間無事者。亦有膈間常如酸折。皆飲食傷。兼中脘所致。生料平胃散。加神麯麥蘗各半錢。或八味平胃散。

咳逆

胃實卽噫。胃虛卽噦。逆者。胃中虛。膈上熱也。咳逆爲病。古爲之噦。近爲之呃。乃胃寒所生。寒氣自逆而呃上。此證最危。間有熱呃。已見傷寒證。其有他病發呃者。皆屬寒。宜用半夏一兩。生姜兩半。水一碗。煎半碗熱服。或用丁香十粒。柿蒂十箇。切碎。白水盞半煎。或理中湯加枳殼茯苓各半錢。半夏一錢。不効。更加丁香十粒。

亦有無病。偶然致呃。此緣氣逆而生。重者或經一二日。宜小半夏茯苓湯。加枳實半夏湯。或用煎湯泡蘿蔔子。研取汁。調木香調氣散。乘熱服。逆氣用之。最佳。若胃中寒甚。呃逆不已。或復加以嘔吐。輕劑不能取效。宜丁香柿蒂散。及以附子粳米湯。增炒川椒丁香。每服各二十三粒。

祕傳證治要訣卷之七

寒熱門

瘧寒熱

瘧證不一。其名亦殊。初得之。病勢正熾。一二發間。未宜遽截。不問寒熱多少。且用清脾飲。草果飲。或二陳湯加草果半錢。或生料平胃散加草果半錢。前胡半錢。亦有非瘧非勞等疾。而自成寒熱。乃是痰飲爲之。不可不審。去痰行飲。則愈。

初發之際。風寒在表。雖寒熱過後。而身體常自疼。常自畏風。宜草果飲。或養胃湯。每服加川芎草果各半錢。熱少者進取微汗。寒多者宜快脾湯。或養胃湯。每服加草果半錢。服藥後寒仍多者。養胃湯。每服加熟附官桂各半錢。獨寒者尤宜。不効。則七聚湯。熱多者宜驅瘧飲。或參蘇飲。每服加草果半錢。大熱不除。宜小柴胡湯。渴甚。則佐以五苓散。入辰砂少許。獨熱無寒。宜小柴胡湯。熱雖劇不甚渴者。於本方加桂四分。熱多而脾氣怯者。柴朴湯。寒熱俱等者。常服。宜如上項二陳湯。平胃散。加料之法。發日進柴胡桂姜湯。候可截則截之。有獨熱。用清脾飲効者。內煩增參作一錢重。然恐非特可治獨熱也。

食瘧。乃是飲食傷脾得之。

或瘧已成而猶不忌口。或寒熱正作時吃食。其人噫氣吞酸。胸膈不利。宜生料平胃散。每服加草果半錢。砂仁半錢。仍佐以紅丸子七香散。

暑瘧。其人面垢口渴。雖熱已退後。無事之時。亦常有汗。宜養胃湯一貼。香薷飲一貼。和勻作二服。渴甚。汗出多者。加味香薷飲。間進。辰砂五苓散。不問未發。其人嘔吐痰食俱出。宜多進二陳湯。每服草果加之半錢。又恐伏暑蘊結爲痰。宜消暑丸。更於暑瘧中求之。有四五發已後。應諸證。並可截瘧丹。未愈再進。

久瘧。經年累月。名曰瘧母。又名勞瘧。不宜十分攻之。所謂久瘧不治者是也。進四獸飲。間山甲圓。瘧愈後調理。宜生料平胃散。每服加人參茯苓各半錢。或用四君子湯加陳皮一錢半。卽異功散。

外有傷寒。往來寒熱。如瘧。勞病。往來寒熱。亦如瘧。謂之如瘧。非眞瘧也。然傷寒寒熱。如瘧。初必惡風寒。發熱。頭痛體疼。自太陽經而來。勞病寒熱如瘧。初必五心發煩熱。勞倦咳嗽。久乃成寒熱。與正瘧自不同。諸病皆有寒熱。如失血痰飲。癥瘕積聚。小腸癇氣。風寒暑濕。食傷發勞。勞瘵瘡毒。腳氣。已各見本門。其餘不能盡舉。應有不如發瘧之傳爲寒熱者。須問其元有何病。而生寒熱。則隨病施治。寒熱發作有期者。瘧也。無期者。諸病也。

近世因寒熱發作。見其指甲青黑。遂名曰沙。或戛或挑。或灌以油茶。且禁其服藥。此病卽是南方瘴氣。生料平胃散加草果檳榔。正宜所治。豈有病而無藥哉。

獨寒

有寒而未即爲熱者。或寒一二日後。方熱。有寒而終於無熱者。惟傷寒有此爲多。他證亦或有之。當隨證施治。

有虛常自畏寒。或覺冷在骨肉間。或冷從下起。經旬積月。宜以果附爲君治之。

獨熱

三消。諸失血後。虧勞久痢諸虛後。發熱者。皆非美證。有當直攻其發者。有不當專治其熱者。因他病而發爲熱者也。當隨證用藥中加入退熱藥。

外有每遇夜身發微熱。病人不覺。早起動作無事。飲食如常。既無別證可疑。只是血虛。陰不濟陽。宜潤補之。參蘇飲二分。四物湯一分。和勻。名茯苓補心湯。候熱稍減。繼以養榮湯十全大補湯。

又有服金石辛熱者。甘草烏豆湯下。火邪者。艾湯下。飲食者。乾姜湯下。炙煿者。枳殼甘草湯下。

潮熱 附虛煩

潮熱有二。有實而潮熱者。有虛而潮熱者。惟傷寒日晡發熱。乃胃實別無虛證。其餘有潮熱者。當審其虛實。若潮熱大便堅澁。喜冷畏熱。心下愠然睡臥不着。此皆氣盛。所謂實而潮熱者也。輕宜參蘇飲。重則小柴胡湯。

若潮熱而氣消乏。精神憔悴。飲食減少。日漸羸瘦。雖病蹔去。而五心常有餘熱。此屬虛證。宜茯苓補心湯。十全大補湯。養榮湯之類。病後欠調理者。八珍散主之。

有潮熱似虛胸膈痞塞背心疼痛服補藥不効者此乃飲證隨氣而潮故熱隨飲而亦潮宜於傷飲中尋藥

諸汗併霍亂吐瀉後應有滲泄而津液去多五內枯燥者皆能虛煩以陰血不足以濟陽陽氣偏勝故虛熱而煩宜參蘇飲去蘇倍參加麥門冬半錢煩而渴者獨味人參湯加以小便不利者春澤陽加以心經熱而躁者辰砂五苓散煩而嘔不喜食者橘皮湯煩而睡不寧者溫膽湯大煩身熱甚者竹葉石膏湯血虛生煩見前諸證者茯苓補心湯外有一得病時節卽惡寒身不疼頭不痛但煩熱者亦名虛煩內外俱不可攻之必遂損竭宜參蘇飲去蘇倍參或更加石膏半錢不愈者竹葉石膏湯兼有上項證候者於前藥選用其人虛甚不宜專用涼劑者茯苓補心湯

祕傳證治要訣卷之八

大小腑門

小便多

小便多者。乃下元虛冷。腎不攝水。以致滲泄。宜菟絲子丸八味丸。玄菟丹。生料鹿茸丸。有人每日從早至午前。定尿四次。一日之間。又自無事。此腎虛所致。亦由脾腎泄。早泄而晚愈。次日又復然者也。

若小便常急。偏數雖多。而所出常少。放了復急。不澁痛。卻非淋證。亦有小便畢。少頃忽再出些小者。多因自忍尿。或忍尿行房事而然。宜生料五苓散。減澤瀉之半。加阿膠一錢。吞八味丸。此丸須用五味子者。睡着遺尿者。此亦下元冷。小便無禁而然。宜大菟絲子丸。豬胞炙碎煎湯下。（凡遺尿皆屬虛。古書云。實則失氣。虛則遺尿。）有盛喜致小便多。日夜無度。乃喜極傷心。心與小腸爲表裏。宜分清飲。四七湯各半貼和煎。仍以辰砂妙香散。吞小菟絲子丸。或玄菟丹。

淋閉

古名曰癃者。能也。不通爲癃。不約爲遺。小便滴瀝。澁痛者。謂之淋。小便急滿不通者。謂之閉。宜五苓散。燈

心湯調服。暑月多有此患。止宜本藥。閉而不通。臍下脹爲癰。起以燈心湯。五苓散。或洗慈湯。調獨味琥珀末。仍令其以鹽填臍下。更滴之以水。

若服涼藥不效。審是冷祕。宜炒鹽熨其小腹。或洗慈湯薰洗。有腹急而小便若不通。用劑愈甚。宜以鹽實臍中。就鹽上灼艾十來壯。

有淋病。下諸通便劑愈不通。用木香流氣飲。或別用通氣香劑纔愈者。此乃氣淋。出於冷熱淋之外。

有似淋非淋。小便色如米泔。或便中有如鼻涕之狀。此乃精尿俱出。精塞竅道。故便欲出不能而痛。宜大絲子圓。鹿茸圓之類。然此卽膏淋。謂其非淋。亦不可。血淋一證。須看血色。分冷熱。色鮮者心小腸實熱。色瘀者腎膀胱虛冷。若的是冷淋。及下元虛冷。血色瘀者。並宜漢椒根。剉碎。不拘多少。白水煎候冷進。

小便澁痛。常急欲溺。及去點滴莖中痛不可忍者。此五淋病。生料五苓散。加阿膠七分。或五苓散。加車前子末少許。或五苓散和益元散等分。或五苓散。並可吞火府丹。佐以導赤散。

若熱極成淋。服藥不効者。宜減桂五苓散。加木通滑石燈心瞿麥各少許。仍令其研麥門冬草。連根車前草白龍草蜜水調下。

若淋瀝有血者。宜加五苓散。或生料五苓飲。和五淋飲。或導赤散。仍研地錦草水解服。進冷劑愈甚者。此是冷淋。宜地髓湯。下附子八味圓。有因服五苓散等藥不効者。用生料鹿茸圓卻愈。此症病於下元虛冷之故。

有小便艱澁如淋。不痛而痒者。此亦屬虛。宜八味圓。生料鹿茸圓之類。若因思慮用心過度。致淋。辰砂妙香散。吞威喜圓。或妙香散。和五苓散。

汗多而小便赤澁。暑月多有此證。盛暑所飲既多。小便反澁少而赤。緣上停爲飲。外發於汗。津道不通。小腸澁閉。則水不運。下五苓散。一名導。逆內有朮桂收汗。豬苓澤瀉茯苓分水道。收在其外者。使之內。又從而利導焉。發者斂之。壅者通之。義取於此。然有虛勞汗多。而小便赤澁者。卻是五內枯燥。滋腴既去。不能生津。故漏澁而赤。不宜過用通小便之劑。竭其腎水。惟當温養潤肺。十全大補湯。養榮湯之類。自足選用。汗者。心液。心主血。養血則心得所養。汗止津生。不待通溺而自清矣。諸失精血。及患癰毒人。忽有小便赤澁之證。此亦是枯竭不潤之故。

尿血見諸血門本證

或有氣閉而小便不通。至臍下氣痕結痛。以五香散。間服獨味琥珀末。以燈心湯下。甚効。女人多有此證。

白濁

有白濁人。服玄兎丹不愈。服附子八味圓即愈者。不可不知。

有小便如常。停久纔方淀濁。有小便出即如泔。若小兒泔病者。並宜分清飲。加白茯苓半錢。

如服藥未効。宜四七湯。吞青州白圓子。及辰砂妙香散。吞玄兎丹。及小兎絲子圓。山藥圓。如白濁甚。下淀如泥。或稠黏如膠。頻逆而澁痛異常。此非是熱淋。此是精濁窒塞竅道而結。宜五苓妙香散。吞八味圓。小

菟絲子圓。精者血之所化。有濁去太多。精化不及。赤未變白。故成赤濁。此虛之甚也。何以知之。有人天癸未至。強力好色。所泄半精半血。

若溺不赤。無他熱證。縱雖赤濁。不可以赤爲熱。只宜以治白濁施之。

若溺赤下濁亦赤。口渴時發熱者。辰砂妙香散。吞靈砂丹。或清心蓮子飲。發熱不退。口燥舌乾之甚者。此乃精虧內燥。腎枯不潤。四物湯吞玄菟丹。和八味圓久服。乃效。

遺精附遺瀝夢遺

遺精。得之有四。有用心過度。心不攝腎。以致失精者。有因思色欲不遂。精色失位。輸瀉而出者。有欲太過。滑泄不禁者。有年壯氣盛。久無色欲。精氣滿泄者。然其狀不一。或小便後去多不可禁者。或不小便而自出。或莖中出而痒痛。常如欲小便者。並宜先用辰砂妙香散。吞玉華白丹。佐以威喜圓。或分清飲。別以綿裹龍骨同煎。或分清飲半貼。加五倍牡蠣粉白茯苓五味子各半錢。

失精夢泄。亦有經絡熱而得者。若以虛冷用熱劑則精愈失。本事方清心圓。用黃皮腦子者。最良。然亦必恍惚腦熱。乃驗其熱證也。以此見赤濁。亦有自熱而得。亦可用此。

若是用心過度。得之宜遠志圓。用交感湯加蓮子肉五味子吞下。仍佐以靈砂丹。

若審是思色欲不遂得之。且以四七湯吞白圓子。甚者耳聞目見。其精即出。名曰白淫。妙香散。吞玉華白丹。

若審是色欲過度下元虛憊泄滑無禁宜正元飲加牡蠣粉肉蓯蓉各半錢吞養氣丹或靈砂丹仍佐以鹿茸圓山藥圓大菟絲子圓固陽圓之類

審是壯盛滿溢者本事方清心圓仍服黃耆六一湯便雖非對緣精髓滿溢姑以白燥之

遺瀝比之遺精稍少小便有數點稠黏莖頭微痛或小便已停原時方有一二滴沾褌其病不出前所因宜審用前藥

夢遺俗謂之夜夢鬼交宜溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁炒茯神各半錢吞玉華白丹固陽圓

夢遺亦備前肆證宜審其所惑用前藥

治小便注楫甘瘡用腦子二錢半鴈爪黃蓮一錢半盧甘石一錢葱頭七箇陳荷葉一片花椒一撮先以葱頭荷葉花椒煎湯二碗待溫時留瓶內浸洗小便乾淨將前盧甘石用火煆紅於煎至黃蓮水內浸濕又燒又浸燒烊爲度安於冷地上以椀蓋之候冷研末入腦子和勻將前湯洗淨用藥末之妙不過二三度即愈

三消

三消得之氣之實血之虛也久久不治氣儘虛則無能爲力矣有一僧專用黃耆飲加減其論蓋詳之益血爲主三消小便去多上消消心心火炎上大渴而小便多中消消脾脾氣熱燥飲食倍常皆消爲小便下消消腎腎衰不能攝水故小便雖多而渴然小便既多津液必竭久而未有不渴者謂之全不渴未有

的論諸消不宜用燥烈峻補之劑惟當滋養除消脾外心腎二消宜用黃耆飲吞八味圓或玄菟丹或小菟絲子圓又竹龍散皆可又用六神飲亦治腎消惟脾消則加當歸去黃耆三消小便既多大便必祕宜常服四物湯潤其大腸如加人參木瓜花粉在人仍煑四皓粥食之糯米泔折二亦可冷進三消久而小便不臭反作甜氣在溺桶中滾涌其病爲重更有浮在溺面如豬脂濺在桶邊如蠟燭淚此精不禁眞元竭矣

上消中消心脾既如此熱小便澁少而反無禁蓋燥熱在上虛冷在下陰陽不交所以成消渴

三消久之精血既虧或目無見或手足偏廢如風疾非風然此證消腎得之爲多消心之病往往因欲飲食過多及食啖辛熱飲引既多小便亦多當抑心火使之下降自然不渴宜半夏瀉心湯去乾姜加栝蔞乾葛如其數吞豬肚圓或酒連圓仍佐獨味黃連湯多煎候冷遇渴恣飲久而自愈或白糯米煑稀粥然同調湯梅花湯二藥於三消有渴者皆可用若因用心過度致心火炎上渴而消者宜黃耆飲加蓮肉遠志各半錢吞玄菟丹仍以大麥煎湯調下靈砂丹

消脾緣脾經燥熱食物易化皆爲小便轉食轉饑然脾消又自有三曰消中曰寒中曰熱中宜用蓮茗飲加生地黃乾葛各半錢或烏金散或止用蓮茗飲

若因色欲過度水火不受腎水下泄心火自炎以致渴濁不宜備用涼心冷劑宜堅腎水以濟心火當用黃耆飲加從蓉五味各半錢吞八味圓及小菟絲子圓玄菟丹鹿茸圓加減安腎圓皆可選用或靈砂丹

消腎爲病比諸爲重古方謂之強中又謂之內消多因恣意色欲或餌金石腎氣既衰石氣獨在精水無取養故常發虛陽不交精出小便無度脣口乾焦黃耆飲吞玄菟丹八味圓鹿茸圓加減腎氣圓小菟絲子圓靈砂丹皆可選用或未效黃耆飲加從蓉北五味山茱萸各四分薺龍圓蓯蓉圓又有果木渴因多食果子所致宜麝香之藥

大便祕

有風祕冷祕氣祕熱祕又有老人津液乾燥是名虛證婦人分產亡血及發汗利小便病後血氣未復皆能作祕俱宜麻仁圓風祕之病由風搏肺臟傳於大腸故傳化難或其人素有風病者亦多有祕宜小續命湯去附子倍芍藥入竹瀝兩蜆殼許實者吞脾約麻仁圓虛者吞養正丹冷祕由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通胃道祕塞其人腸內氣攻喜熱惡寒宜藿香正氣散加官桂枳殼各半錢吞半硫圓熱藥多祕惟硫黃煖而通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄氣祕則氣不升降穀氣不行其人多噫宜蘇子降氣湯加枳殼吞養正丹或半硫圓來復丹未效佐以木香檳榔圓欲其速通則枳殼生用

熱祕面赤身熱腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡此由大腸熱矣宜四順清涼飲吞順腸圓或木香檳榔圓有氣作疼大便祕結用通劑而便愈不通便有祕氣強飲通之雖通復閉或迫之使通因時下血者此惟當順氣氣順便自通順氣之法又當求溫煖之劑曾有下巴豆等藥不通進丹附卻通不可不知

老人虛祕及出汗利小便過多一切病後血氣未復而祕者宜蘇子降氣湯倍加當歸吞威靈仙圓或肉

黃飲蒌順腸圓尤宜。

如婦人下血而祕者。見婦人門。

傷寒陽明經熱實而閉。見諸傷門傷寒證。

宿食留滯。結而不通。腹脹氣急。胸中痞滿。宜感應圓加巴豆。

凡諸祕服藥不通。或兼他證不受藥者。用蜜皂角兌冷祕生姜兌亦佳。

溏泄

冷泄不言而喻。熱亦能瀉者。蓋冷瀉譬之鹽見火熱則凝。冷則復消。熱瀉譬之水寒則結凝。熱則復化爲水。此外證狀不一。疑似之間。並用先見分水圓一二服。惟傷食瀉不可用。

寒瀉。寒氣在腹。攻刺作痛。洞下清水。腹內雷鳴。米飲不化者。理中湯或附子補中湯。吞大已寒圓。宜附子桂香丸。畏食者。八味湯。

五虛者。死。脈細脾寒。少氣。前後泄痢。飲食不入。元是冷瀉因瀉而煩躁。飲水轉飲轉瀉者。參附湯。理中湯。加茯苓黃連。名連理湯。用之多有奇功。且如今當暑月。若的知暑瀉。自合用暑藥。的知冷瀉。自合熱藥。中間有一等盛暑。又復內傷生冷。非連理湯不可。下泄無度。泄後卻彈過。譬肛門熱。小便赤澁。心下煩渴。且又喜冷。此藥爲宜。若元是暑瀉。經久下元虛甚。日夜頻併。暑毒之勢已然。而瀉不已。後用暑藥。則決不能取效。便用姜附薑。又以難施。疑似之間。尤宜用此。余生治傷寒協然自利。有用白姜黃連對半。名金銀湯。

卽此意也。然不若連理湯爲穩。如寒瀉服上藥未效。宜木香湯。或姜附湯。六柱湯。吞震靈丹。養氣丹。手足厥逆者。兼進硃砂丹。藥食方入口而卽下者。名曰直腸。難治。如瀉已愈而精神未復舊者。宜十補湯。寒瀉腹中大疼。於服前藥外。間進乳豆圓。服諸熱藥以溫中。並不見效。登圊不迭。穢物而出。此屬下焦。宜桃花圓二五粒。訶梨勒圓以澁之。

熱瀉糞色赤黃。彈響作痛。糞門焦痛。糞出穀道。猶如湯熱。煩渴小便不利。宜五苓飮。吞香連圓。

暑瀉由胃感暑氣。或飮啖日中之所晒物。坐日中熱處。證狀與熱瀉略同。宜胃苓飮。或五苓散。加車前子少許。兼進來復丹。凡瀉津液既去。口必渴。小便多是赤澁。未可便作熱論。的知熱瀉方用冷劑。不然。勿妄投。以致增劇。瀉止渴自止。小便亦能如常。

氣瀉腸鳴。氣走胸膈。痞悶腹急而痛。瀉則腹下須臾又急。亦有腹急氣塞而不通者。此由中脘停滯。氣不流轉。水穀不分所致。宜大七香圓。入米煎服。久而不愈者。寬中散。吞震靈丹。仍佐以米飮調香附末。

濕瀉由坐臥濕處。以致濕氣傷脾。土不克水。梅雨陰久。多有此病。宜除濕湯。吞戊己圓。佐以胃苓湯。重者宜朮附湯。如其人本不甚瀉。每日兩三次。鴨溏。此脾家不燥。常服平胃散自愈。緣內有蒼朮可以燥脾。

傷食瀉因飮食過多。有傷脾氣。遂成瀉泄。俗呼爲傷敗腹。其人必噫氣如敗卵臭。宜治中湯。加砂仁半錢。或七香圓。紅圓子雜服。

食積腹疼而瀉。不可遽用治中兜住。先用調脾飮。吞感應圓。或因食一物過傷而瀉。後復食之。卽瀉者。以

脾爲其所傷未復而然。宜健脾湯。因食冷物停滯傷脾。脾氣不煖。所食之物。不能消化。瀉出而食物如故。宜治中湯加乾葛。吞酒煮黃連圓。於瀉中求之。

有脾氣久虛不受飲食者。食畢卽腸鳴腹急。盡下所食物。纔方寬快。不食則無事。俗名錄食瀉。經年累月。宜快脾圓下二五粒。因傷於酒。每晨起必瀉。宜理中湯加乾葛。吞酒煮黃連圓。

或重而瀉泄頻數者。宜冲和湯。

因傷麵而瀉者。養胃湯加蘿蔔子。炒研破一錢。痛者更加木香半錢。瀉甚者。去藿香加炮姜如其數。

瀉已愈隔年。及後期復瀉。古論云。病有期年而發者。有積故也。宜感應丸。

有每日五更初洞瀉。服止瀉藥並無效。米飲下五味圓。或專以杜五味煎飲。宜治脾腎泄。雖省節飲食。大段忌口但得日間上半夜無事。近五更其瀉復作。此病在腎。俗呼脾腎泄。分水飲下二神圓。及椒朴圓。或平胃散。下小茴香圓。病久而重。其人虛甚。椒附湯。

交腸

交腸之病。大小便易位而出。蓋因氣不循故道。清濁混淆。宜五苓散調氣散各一錢。加阿膠末半錢。湯調服。或研黃連阿膠丸爲末。加木香末少許。再以煎湯送下。

瀉血

瀉血當辨其色。色鮮爲熱。色瘀爲寒。熱血連蒲飲。寒血理物湯。血色鮮紅者。多因內蘊熱毒。毒氣入腸胃。

或因飲酒過多及啖糟藏炙煿引血入大腸故瀉鮮血宜連蒲散吞黃連阿膠丸及香連丸或一味黃連煎飲大瀉不止者四物湯加黃連槐花仍取血見愁草少許生姜搗取汁和米飲服於血見愁草中加入側柏葉與生姜同搗汁尤好有毒暑入腸胃下血者一味黃連煎湯飲有腸風下血以香附末加百草霜米飲調服加入麝香少許其應尤捷瀉血色瘀者爲寒血逐氣走冷氣入客腸胃故下瘀血理中湯不效宜黑神散米飲調下中用附子者佳或用膠艾湯加米煎吞震靈丹

擷撲內損惡血入腸胃下出濁如瘀血者宜黑神散加老黃茄爲末酒調下

有風入腸胃純下清血或風濕入腸胃下如豆汁或下瘀血並宜胃風湯膠艾湯

瀉血或淡或濁或鮮或瘀亦宜胃風湯吞駐車丸或獨瀉血或與糞俱出當辨其色與所感施治

有腹痛者乃是血不循理故爾作痛卻無裏急後重及纏墜等患不可因痛認爲血痢

婦人因月事不通血不循故道從後分出者當調其經見婦人門

瀉血過多手足厥冷而眩暈者當審其寒熱施治不可因眩暈而便用附子熱藥寒血猶可熱血爲害不少

腸風臟毒附痔漏腸癰

血清而色鮮者爲腸風濁而黯者爲臟毒或在糞前或在糞後並宜米飲湯調枳殼散下酒煮黃連圓或

枳殼散。或烏梅圓。此乃因登圊糞中有血。卻與瀉血不同。或用小烏沉湯和黑神散。米飲調下。糞前後有血皆可用。色瘀尤甚捷。

臟毒者。蘊積毒氣。久而始見。腸風者。邪氣外入。隨感隨見。此三因方五痔臟毒腸風辨之甚詳。臟毒腸風之血。出於腸臟間。五痔之血。出於糞門竅孔處。治各不同。無擇翁烏連湯。治脈痔外無形。而所下血一線如箭。或點滴下不能已。此由脈竅中來也。其方已錄千里鏡。

血色清鮮者。以瓦松燒灰研細。米飲調服。宜減桂五苓飲。加茅花半錢。吞荊梅花圓。仍以側柏葉同姜爛搗。冷水解下。侵些米飲佳。

如血色淡濁者。胃風湯吞蒜連圓。或烏荊圓。或棕灰散。仍以米飲調香附末。或三灰散。

或久而不已。面色痿黃。漸成虛憊。下元衰弱者。宜黃耆四君子湯。下斷紅圓。或十全大補湯。或黃耆飲。諸般腸風臟毒。並宜生銀杏四十九箇。去殼膜爛研。入百藥煎末。圓如彈子大。每兩三圓。空心細嚼。米飲下。

痔漏證狀頗多。自屬外科。不復縻引。既血自內出。不可全仗外傅。宜只蒞散。吞釣腸圓。痔正發而血多者。亦宜自裏托之。宜千金內補散。減桂之半。加鱉頭血尤妙。

腸癰。卽腸中生癰也。腹中疼痛。其始發熱惡寒。證狀難辨。因下膿血。乃覺。或小腹痛滿。或小便澁滯。或膿從臍出。宜千金內補散。太乙膏。

痢附痢後風脫肛

痢疾古名滯下。以氣滯成積。積成痢。治法當以順氣爲先。須當開胃。故謂無飽死痢病也。痢疾不問赤白而知爲冷熱之證。若手足和暖。則爲陽。先用粟殼飲。調五苓散。進感應圓。若覺手足厥冷則爲陰。當用煖劑。須常識此。

凡痢初發。不問赤白。裏急後重。頻欲登圊。及去而所下無多。既起而腹內復急。宜用藿香正氣散。加木香半錢。吞感應圓。或蘇合香圓。吞感應圓。

赤痢血色鮮紅。或如蛇蟲形。而間有血鮮者。此屬熱痢。宜藿香正氣散。加黑豆三十粒。五苓散加木香半錢。粟米少許。下黃連圓。或黃連阿膠圓。茶梅圓。熱甚服上項藥未效。宜白頭翁湯。

若赤痢發熱者。敗毒散加陳倉米一撮煎。

若血色黯如瘀。服冷藥所下愈多。去愈頻者。當作冷痢。宜理中湯。或四君子湯。加肉豆蔻木香各半錢。

若感暑氣而成痢疾者。其人自汗發熱。面垢嘔逆。渴欲引飲。腹內攻刺。小便不通。瘀血頻併。宜香薷飲加黃連一錢。佐以五苓散。白湯調服。不愈則用蜜水調。感暑成痢。疼甚而食不進者。六和湯藿香正氣散各半貼。名木香交加散。

白痢下如凍膠。或如鼻涕。此屬冷痢。先宜多飲除濕湯。加木香一錢。吞感應圓。繼進理中湯。亦有下如魷色。或如腐茶色者。亦宜用前白痢藥。

赤白雜者。宜胃苓飲加倉米一撮煎。吞駐車圓。

凡治痢須先逐去積滯。去已多。三五日後。自可兜澁。不問赤白。俱宜水煮木香圓。或水煮木香飲。眞人養臟湯。或斷下圓。如白痢久而虛甚者。養臟湯加熟附。赤痢加黑豆一小撮。白痢加乾姜一錢。赤痢亦可加黃連一錢。新下者不必加此。在人活法。

禁口痢者。有得病卽不能進食者。或因冷藥幷藥過多不食者。卻不可拘於赤痢難用熱藥之說。當以温中進食爲先。宜治中湯加木香半錢。或縮砂一錢。

休息痢因兜住大早。積不盡除。或因痢愈而不善調理。以致時止時作。宜四君子湯加陳皮一錢。木香半錢。吞駐車圓。只緣兜住積滯。遂成休息。再投去積。卻用兜劑。

勞痢因痢久不愈。耗損積血。致腸胃虛空。變生他證。或五心發熱。如勞之狀。宜蒴連飲。赤多倍蓮肉。白多倍山藥。痢後調補。宜四君子湯加陳皮一錢半。卽異攻散。惡甜者生料平胃散。加人參茯苓各半錢。

諸病壞證。久下膿血。或如死豬肝色。或五色雜下。頻出無禁。有類於痢。俗名刮腸。此乃臟腑俱虛。脾氣欲絕。故腸胃下脫。若投痢藥則誤矣。六柱飲爲穩。或可冀其萬一。

痢後風因痢後下虛。不善調將。或多行。或房勞。或感外邪。致兩腳酸軟。若痛若痹。遂成風痢。獨活寄生湯。吞虎骨四斤丸。或用大防風湯。或多以生樟卽骨碎補。俗乎爲胡孫姜三分之一。同研取汁。酒解服。外以杜仲牛膝杉木節白芷南星葱薤煎湯薰洗。

脫肛一證。最難爲藥。熱則肛門閉。寒則肛門脫。內用磁石研末。每二錢。食前米飲調下。外用鐵銹磨湯温

洗.

下痢小便不通者.黃連阿膠丸爲最.

祕傳證治要訣卷之九

虛損門

五勞

五勞者五臟之勞也。皆已不量才力。勉強運爲。憂思過度。嗜飲無節。或病失調理。將積久成勞。其病頭旋眼暈。身疼腳弱。心怯氣短。自汗盜汗。或發寒熱。或五心常熱。或往來潮熱。或骨蒸作熱。夜多惡夢。晝少精神。耳內蟬鳴。口苦無味。飲食減少。此皆勞傷之證。五臟雖皆有勞。心腎爲多。心主血。腎主精。精竭血燥。則瘵生。治勞之法。當以調心補腎爲先。不當用峻烈之劑。惟當溫養滋補。以久取效。天雄附子之類。投之太多。適足以發其虛陽。緣內無精血。不足當此猛劑。不可因有熱純用甜冷之藥。以傷腎氣。獨用熱藥者。猶釜中無水而進火也。過用冷藥者。猶釜下無火而添水也。非徒無益。又害之耳。宜十全大補湯。或雙和散、養榮湯。七珍散。樂令建中湯皆可選用。間進雙補圓。若有無故身體瘦軟。絕無力氣。別無他證。此平日作勞太過。血氣虛而筋失養。宜劫勞散或和氣湯。倍芎歸。又有言語讀誦過耗神氣。致成虛損。是爲叫呼走氣。宜於十全大補湯等藥選用。

虛人老人病中忽一旦語言不出。扣之不應。此不是啞風。久欠藥力到。補調功成。自復應矣。

氣虛人多不得寢。亦有痰多。膽經伏涎。欲寐不得者。不可例作虛治。妄補則痰愈盛。有於坐臥之中。似欲得人按捻。意方始安者。此亦虛證也。諸發及有寒熱者。已各見本門。審知因虛勞得之。並宜用前藥。未效。用十四味建中湯。渴而不勝熱藥者。七珍散加木香五味子各七分。熱多。黃耆鱉甲散。或人參散。獨五心發熱。將欲成勞者。茯苓補心湯。外雖惡熱。內自畏寒。盛夏不可單衣。大建中湯、十四味建中湯、正元飲、參附湯。

飲食減少。畏食而嘔者。難獨用前滯甜藥。須斟酌用前快脾之劑。縮砂陳皮藥卻不可少。如藥令建中湯內有陳皮半夏細辛卻可用。仍下鹿茸橘皮煎圓。如不嘔不畏食。用前十全大補湯雙和散等藥。亦當少加快脾之劑。以爲之防。

有患精血不足。明知當補腎。方欲一求之歸耆等藥。其人素減食。又恐不利於脾。方欲理脾氣。則不免用疎刷之藥。又恐愈耗腎水。全一舉而兩得之功。莫若鹿茸橘皮煎圓爲第一。故曰精不足補之以味。又曰補腎不如補脾。以脾上交於心。下交於腎故也。道家交構心腎。以脾爲黃婆者。即此意。若腎元大段虛損。病勢困篤。則腎不容少緩。又不拘於此說。要知於滋腎之中。佐以砂仁澄茄之類。於壯脾之中。參以北五味黃耆之屬。此又臨時審病用藥之活法。勞疾久而嗽血。咽疼無聲。此病自下而傳上。若不嗽不痛。久而溺濁脫精。此爲自上傳下。皆死證已。

有面色如故。肌體自充。外看如無病。內實虛損。俗呼爲桃花蛀。宜看其何證。於前藥審而用之。

有傳尸勞、骨肉相傳、甚至滅門、此其五臟中皆有勞蟲、古名瘵疾、難以醫之、

外有因動作勞力、或發寒熱、或身疼氣短、或勞倦嗜臥、乃一時發勞、卻非五勞者比、宜和氣飲、詳見諸痛門身體痛證、

有嗽咳痰多者、名曰勞嗽、與風寒壅熱之嗽不同、此乃有本有標、本在腎而標在肺、可與前諸藥第一段求之、選用加五味杏仁阿膠貝母款冬花之屬、嗽而加以喘者、於前藥更加磨沉香、仍吞靈砂丹、或三妙丹、詳見嗽門、嗽而有血者、詳見血門嗽血證、

盜汗自汗

眠熟而汗出者、曰盜汗、又名一寢汗、不分坐臥而汗者、曰自汗、傷風傷暑、傷寒傷濕、痰嗽等自汗、各載本門、其無病而常自汗出、與病後多汗、皆屬表虛、胃氣不固、榮血漏泄、宜黃耆建中湯、加浮麥少許、煎黃耆六一湯或玉屏風散、或身溫如常而汗出冷者、或身體冷而汗亦冷、別無他病、並屬本證、有痰證冷汗自出者、宜七氣湯、此方已載二百四十九腎逆散之下、有氣不順而自汗不止、須理氣、使榮衛調和、小建中湯加木香、

有病後多汗、服正元飲諸重補劑不愈、惟八珍散宜之、有別處無汗、獨心孔一片有汗、思慮多則汗亦多、病在用心、宜養心血、只宜一條用藥、仍以艾湯調茯苓末服之、名曰心汗、青桑第二葉焙乾研末、空心米飲湯調下、最治盜汗、

若陰汗惟蜜陀僧和蛇床子研末撲之立止。

若服藥汗仍出者。小建中湯加熟附子一錢。不去皮。或正元飲。仍以溫粉撲之。大汗不止。宜於諸藥入煅牡礪粉一分。幷吞硃砂丹。或茸硃丹。

常自汗出。經年累月者。多用黑錫丹。久病及大病新愈汗出者。亦可用此。若不宜熱補。須交濟其陰陽自愈。當以靈砂丹主之。凡此皆非爲他病而止病於汗者設。非謂有兼病者也。

若服諸藥。欲止汗固表裏。並無效驗。藥愈熱而汗愈不收。可只理心血。蓋汗乃心之液。心無所養。不能攝血。故溢而爲汗。宜用大黃耆湯。加炒酸棗仁半錢。有微熱者。更加炒石斛半錢。兼下靈砂丹。

汗出如膠之黏。如珠之凝。及淋漓如雨。揩拭不逮者。難治。漏風頗汗。出諸中門中風證。

應汗多而發虛熱者。不當泥於熱。宜用收斂之劑。汗出而有邪熱者。其人若不渴。小柴胡湯加桂枝半錢最良。

治心虛多汗不睡。猪心一箇。破開帶血。用人參二兩。當歸二兩。粧入心中。煮熟。去二味藥。止吃猪心。不滿三四日。其病卽愈。

眩暈

痰飲頭風七氣失血中酒等病。皆能眩暈。已各見本證。今獨舉不兼他病見眩暈者。是皆虛損也。然有不時眩暈者。有早起眩暈。須臾自定。日以爲常者。正元飲下黑錫丹。

傷濕頭暈。宜著湯加川芎。名除濕湯。

有因虛致暈。雖暈醒時。而常欲近火。欲得煖手按之。蓋頭面乃諸陽之會。陽氣不足故耳。

有頭風證。耳內常鳴。頭上有如鳥雀啾啾之聲。切不可全謂耳鳴爲虛。此頭腦挾風所爲也。有眩暈之甚。擡頭則屋轉。眼常黑花。觀見常如有物飛動。或見物爲兩。宜小三五七散。或芎附湯。生料正元飲。加鹿茸一錢。下靈砂丹。或用正元飲。炒川椒一十五粒。下茸硃圓。若不效。則獨用鹿茸一味。每服半兩。用無灰酒三盞。煎至一盞。去滓入麝香少許服。緣鹿茸生於頭。頭暈而治以鹿茸。蓋以類相從也。曾有頭疼痛不愈。服茸硃丹而效。

虛炎短乏

虛炎陰陽不升降。下虛上盛。氣促喘急。宜蘇子降氣湯。去前胡。下黑錫丹。或養正丹。氣急甚而不能眠臥者。沉附湯或正元飲。或四柱散去木香用沉香。並以鹽煎。下黑錫丹或靈砂丹三妙丹。不效。則以前藥下硃砂丹。

短乏者。下氣不接上。呼吸不來。語言無力。宜補虛四柱飲。木香減半。加黃耆山藥各一錢。若不勝熱藥及痰多之人。當易熟附子作生附。在人活法。餘皆倣此。藥輕病重。四柱飲不足取效。宜於本方去木香加炒川椒十五粒。更不效。則用椒附湯。上焦乾燥不勝熱藥者。宜於椒附湯加人參一錢。尋常病當用姜附。而或上盛燥熱不可服者。惟此最良。

氣短乏力之人。於進藥之外。選一盛壯男子。吸自己之氣。噓入病人口中。如此數次。亦可爲藥力一助。此法不特可治虛乏。尋常氣暴逆致昏者。用之良驗。

驚悸 附健忘

驚悸者。因事有所大驚。觸忤心神。氣與涎鬱。遂生驚悸。此乃心虛膽怯所致。宜溫膽湯。嘔則以人參代竹茹。

若驚悸眠多異夢。隨卽驚覺者。宜溫膽湯。加酸棗仁蓮肉各一錢。以金銀煎下十四友圓。或鎮心丹遠志圓。酒調妙香散。

健忘者。所過之事。轉盼遺忘。此乃思慮過度。病在心脾。宜歸脾湯。

慬忡

慬忡。久思所愛。觸事不意。虛耗眞血。心血不足。遂成慬忡。俗謂心忡脈亂是也。宜益榮湯。

慬忡卽忪悸也。忪悸與驚悸若相類而實不同。驚悸者因事有所驚而悸。忪悸者本無所驚。常心忪而自悸焉得無辨。

感風寒暑濕閉塞諸經而忪忡。各見本門。

因痰飲慬忡者。導痰湯加炒酸棗仁下壽星圓。

失志者。由所求不遂。或過誤自咎。懊恨嗟嘆不已。獨語書空。若有所失。宜溫膽湯。去竹茹加人參柏子仁

各一錢。下定志圓。仍佐以酒。調辰砂妙香散。

有痞塞不飲食。心中常有所怯。愛處暗或倚門後。見人則驚避。似失志狀。此名爲卑慄之卑。以血不足故。示谷神嘉禾散。加當歸半錢。黃耆半錢。

五癎

癎有五。馬牛雞羊豬。五者以其病狀偶類之耳。無非痰涎壅塞。迷悶孔竅。發則頭旋顛倒。手足觸搦。口眼相引。胸背強直。叫吼吐沫。食頃乃蘇。俗止呼爲發豬癎疾。發鷄風。宜星香散。加全蝎三箇。下蘇角圓。

癲狂附心風

癲狂由七情所釀。遂生痰涎。迷塞心竅。不省人事。目瞪不瞬。妄言叫罵。甚則踰垣上屋。裸體打人。當治痰寧心。宜辰砂妙香散。加金箔珍珠末。雜青州白圓子末。濃姜湯調下。吞十四友圓。滑石六一湯。加珍珠末。白湯調下。

有病癲人專服四七湯而愈。蓋痰迷爲顛。氣結爲痰。故也。如健忘。如驚悸。如怔忡五癎。亦宜用此。

如顛狂不定。非輕劑所能愈者。宜太乙膏及抱膽丸。心風者。精神恍惚。喜怒不常。無語時或錯亂。有顛之意。不如顛之甚。亦痰氣所爲也。宜星香散。加石菖蒲人參各半錢。下壽星圓。

有心經蘊熱。發作不常。或時煩燥。鼻眼各有熱氣。不能自由。有類心風。稍定復作。參蘇飲加石菖蒲一錢。

有婦人狂言叫罵。歌笑不常。似祟憑依。一邊眼與口角吊起。或作顛治。或作心風治。皆不效。乃是舊有頭

風之疾。風痰作之使然。用芎心湯加防風十分。數服其頓愈。

不寐

不寐有二種。有病後虛弱及年高人陽衰不寐。有痰在膽經。神不歸舍。亦令不寐。虛者六君子湯加炒酸棗仁炙黃耆各半錢。痰者宜溫膽湯。減竹茹一半。加南星炒酸棗仁各半錢。下青靈丹。傷寒不寐。當於活人書中求之。

自驚悸以後諸證。亦可用溫膽湯加減。同金銀煎竹茹。則隨其寒熱虛實而去取之。導痰湯加石菖蒲半錢尤治。

大抵驚悸健忘。憧忡失志不寐。心風。皆是膽涎沃心。以致心氣不足。若用涼心之劑。太過則心火愈微。痰涎愈盛。病愈不減。惟當以理痰氣爲第一義。

祕傳證治要訣卷之十

拾遺門

渴

諸病中有渴。已各見本證。今特舉其無病自渴與病瘥後渴者。參朮散。四君子湯。縮脾湯。或七珍散加木瓜一錢。皆可選用。生料五苓散加人參一錢。名春澤湯。以五苓散和四君子湯。亦名春澤湯。尤是要藥。重兼作四皓粥食之。

諸病久損。腎虛而渴。宜八味丸。黃耆飲。四物湯加人參木瓜各半錢。或七珍飲大補湯。去朮加木瓜如數。

諸失血及產婦蓐中渴者。名曰血渴。宜求益血之劑。已於血門吐血證中論之。

有無病或然大渴。少頃又定。只宜蜜湯及縮脾湯之類。折二泔冷進數口亦可。

酒渴者。乾葛調五苓散。

疸附面黃

黃而自疸。大略有五黃。脾土色也。脾臟受傷。故病見於外。通身面目悉黃。並宜生料五苓散。加茵蔯或五苓散平胃散各半貼。名胃苓飲。黃汗因脾胃有熱。汗出入水澡浴所致。故汗黃熱染衣。只宜前藥黃疸因

酒食過廣。臟腑極熱。復爲風濕所搏。結滯不散。濕熱鬱蒸。故通身眼目悉黃。或發寒熱。亦宜前藥。酒疸因飲酒過傷而黃。俗名爲酒黃。宜乾葛煎湯。或梔子仁煎湯調五苓散。或生料五苓飲。加乾葛一錢。

有酒疸後變成腹脹。漸至面足俱腫。及偏身。宜藿香脾飲加木香三錢。或木香麥孽各半錢。

飲酒卽睡。酒毒薰肺。脾土生肺金。肺爲脾之子。子移病而尅於母。故黃。又肺主身之皮膚。肺爲酒毒薰蒸。故外發於皮而黃。此二說故通。法當合脾肺而治。宜藿枇飲。

穀疸因失饑傷飽。胃氣薰蒸而黃。食必卽眩暈。宜紅圓子。

女勞疸因色後爲水濕所搏。故額黑身黃。小腹急滿。大便不利。以大麥一撮。同滑石石膏末各一錢煎。

諸疸口淡怔忡。耳鳴腳軟。當作虛治。宜四君子湯。吞八味圓。五味子附子者皆可用。不可過用涼劑。強通小便。恐腎水枯竭。久而面黑。黃色不治。

傷脾致疸。已見之前。黃疸證下。外有暑毒傷脾。小便不利。亦能成疸。煎茆花湯。調五苓飲。

諸失血後。多令面黃。蓋血爲榮。面色紅潤者。血榮之也。血去則面見黃色。譬之草木。春夏葉綠。遇秋葉黃。潤與燥之別也。宜養榮湯。枳歸湯十全大補湯。妨食者。四君子湯。加黃耆扁豆各一錢。卽黃耆四君子湯加陳皮。名異攻散。加此二味。亦得。亦有偏身黃者。但黃不及耳目。

病瘧後多黃。蓋瘧謂之脾寒。脾受病故色見於面。宜理脾爲先。異攻散加黃耆扁豆各半錢。諸痛後黃者亦宜。

農民黃腫病。因飽作勞脾氣不舒。宜楊法師勝金圓。

眼

醫眼以青桑乾枝。就硬炭火上燒取白灰。銅筋點二三次妙甚。不可用水桑黃桑。亦不可雜炭灰。眼病不一。爛泪惡泊羞明。醫膜澁痛雀目韜針內外障等證。難以枚舉。今獨舉赤眼數種。應患眼者。不問遠年近有。上諸證並可用四物湯。下生熟地黃圓。傳洗之劑。當求之專科。四物湯加入蒸熟大黃一塊。如栗子大。尤妙。

有久視損目。肝血不足。以致見物不明。眼中常見烟焰起。此當益血。宜生熟地黃圓。

有因茹素致目少光。或成雀目。蓋食能生精。虧之則目無所資而減明。

眼疾諸證。醫家多用治眼流氣飲。此則專門之業也。尋常赤眼用黃連碾末。先用大菜頭一箇。切了蓋。剜中心作一竅。入連末在內。復以蓋遮住。竹簽簽定。慢火內煨熟取出。候冷以菜頭中水滴入眼中。

赤眼有數種。氣毒赤者。熱壅赤者。有時眼赤者。無非血壅肝經所主。蓋肝主血。通竅於眼。赤眼之病。大率皆由於肝。並黑神散消風散等分。白湯調。食後睡時服。仍用豆腐切片傅其上。鹽就者可用。酸漿者不可可。卽烏豆傅瞼之意。

風熱赤甚者。於黑神散消風散二藥中。放令消風頭高。間以折二泔。睡時冷調洗肝散或菊花散服。仍進四物湯。內地黃用生。芍藥用赤。只須半貼。食後作一服。卻加入赤茯苓半錢。醉將軍卽酒蒸大黃是也。早

晨鹽湯下養正丹二十三十粒。

若不便於過涼之劑。則不必用洗肝散。宜以二錢黑神散。一錢消風散。

若赤眼久而不愈。用諸眼藥皆無效。早起則以蘇子降氣湯。下黑錫丹。臨睡則以消風散。下三黃圓。日中別以酒調黑神散。此數藥不獨治久赤。諸眼疾皆治之。

若眼暈生花。則屬肝虛。當於虛損門眩暈證求藥。或正坐他病以致病花。合就其所得之病。隨證施治。

又有氣眼。纔怒氣則亦痛。宜服酒調復元通氣散。

又有頭風眼。偏正頭痛。眼不可開。多淚羞明。宜決明散。

耳

耳爲腎竅。耳病皆屬於腎。腎虛故耳中或如潮聲蟬聲。或暴聾無聞。宜鳴聾散。或嚼蠟用酒下。及黃臘粥食之。

腎經久虛。耳中潮聲蟬聲。無休止時。妨害聽聞者。當墜氣補腎正元飲。嚥黑錫丹。間進安腎圓。

風毒攻耳。致生膿者。名停耳。先以綿枝子撚出膿。令淨。次用桃花散吹入。或以多年陳皮去白。麻油燈上燒存性。碾末入麝香少許。加桃花散法加用乾臙脂白礬。

鼻

酒查鼻屬肺風。有不能飲而自生者。非盡因酒。酒查乃俗呼耳。宜一味折二泔。食後用冷飲。外用硫黃入

大菜頭內碾塗之。若鼻尖微赤及鼻中熱生瘡者。辛夷碾末入腦麝少許。綿裹納之。或以枇杷葉拭去毛。不須塗炙。剉細煎膿湯。候冷調消風散。食後臨臥進。

鼻塞流涕不止。有冷熱不同。清涕者腦冷肺寒所致。宜細辛烏附乾姜之屬。濁涕者乃素問所謂膏移熱於腦。故煩鼻淵是也。宜防風甘菊之屬。須以清濁別冷熱。

一方用蒼耳子。卽縑絲草子。炒碾爲細末。食後入藥末點服立效。

有不因傷冷而涕多。涕或黃或白。或時帶血。如腦髓狀。此由腎虛所生。不可過用涼劑。宜補腦散。仍以黑錫丹紫靈丹靈砂丹。

傷冷熱。鼻暴塞。流涕多者。通關散。

鼻衄見血門鼻衄證。

餘處無恙。獨鼻尖色青黃者。此其人必爲淋也。鼻尖微白者。亡血也。赤者血熱也。

外有鼻痔。辨患不能盡舉。外科方論。

口舌附音聲

口舌生瘡。皆有上焦熱壅所致。宜如聖湯或口梗湯加黃芩一錢。仍用杏花散摻之。未效則參以四香飲。

有聲音不出之人。服冷劑愈失聲。乃是腎經虛寒。投附子之劑數枚方可。此不可不識。

下虛上盛。致口舌生瘡。若用鎭陰之藥。以降陽湯宜鹽水下養正丹或黑錫丹。仍於臨臥熱湯洗足。炒探

淨吳茱萸小撮拭足了．便以炒熱致足心．用片紮之．男左女右．

曾有舌上病瘡．久閣成穴．累服涼劑不效．後來有教服黑錫丹．遂得漸愈．此亦下虛故上盛也．

外有舌脹腫脹．名曰重舌．一味眞蒲黃末摻之．

又有舌無故常自痹者．不可作風治．由心血不足．理中湯加熟附半錢．當歸錢半．

齒

齒痛見諸痛門齒痛證．其他齒患不一．自有口齒專科．牙齦見齦門．

祕傳證治要訣卷之十一

瘡毒門

癰疽癤毒附發背

發散諸般毒多碾白芙蓉葉入草烏葉少許蜜調傅重者加入南星末凡諸毒用膏藥欲散搓入麝香欲潰搓入雄黃

一應毒證已作渴或膿過多防其爲渴宜於千金內補散之外兼進八味圓用五味者佳

發熱惡寒狀如傷寒而痛者其痛處欲爲癰疽癰屬腑故生淺皮薄而腫高疽屬臟故生深皮厚而腫堅又有輕於癰疽者名曰癤毒癰壅也疽沮也癤節也言氣血壅滯沮節也並威靈仙飲微利之或五香連翹散佐以復元通氣散若膿血結成不可發散已潰未潰宜小托裏散或千金內補散加木香羌活白芍藥烏藥等分渴加括蔞根此數藥皆治陽證若陰證宜於千金內補散減防風桔梗之半倍加白朮未效更加熟附與諸藥煎服尤佳

外有服金石以助欲至精氣既衰藥毒偏勝金石與肺同類肺附於腎所以多成發背之疾又有好鴈爲臛亦至發背蓋鴈之陽氣皆聚於上甲所以上甲可入藥也治法同前若毒發於陰而又未可用附桂諸

藥劑。外疼內寒。宜五香湯。

毒之初發。並宜酒調復元通氣散。或病在下者。酒糊圓。通氣散。卻用木香湯吞下。

治諸毒方結成者。以皂角樹上所生之甚。磨烏醋調塗。此甚須預藏在烟閣頭。緩急取用。

患背瘡人及諸毒已潰後。血去過多。津液少者。宜換肌散。毒初發。頭疼體痛。乍寒乍熱。恐挾外邪。宜香蘇飲。加川芎白芷防風。當歸陳皮之類。

病消渴之人多生毒。此乃津液已耗。虛陽外發。內外俱虛。此爲極病。凡消渴愈後生毒。毒愈後消渴。皆非可治之病也。

癰疽癤。此毒總名。亦舉其大槩耳。其他證狀不一。名稱亦異。未潰之際。增寒壯熱。狂言妄語。如見鬼神。膿去已多而大熱不休者。似爲難治。蓋毒之得膿。猶傷寒病證之得汗。汗已而反大熱。則爲壞傷寒矣。若淋洗貼傅。自屬外科。癰疽發背已潰。出膿過多。而羸瘦者。芎歸湯。凡所服藥。並不可用白朮。能生膿故也。未潰與初發陰證用之卻可。

若其人嘔不喜食。不可用千金內補散。滯其脾。恐挾外邪。未潰者二陳湯加芎。或不換金正氣散。已潰者穀神加禾飲。

又一方治毒並不喜食。於不換金正氣散加白茯苓半夏等分。人參木香減半。亦名正氣散。

患癰毒人膿血已潰。所去過多。津液枯竭。多病於渴。縱有發熱燥擾等證。不可以治者。用益榮生津之劑。

若大熱不止者難治。

腸癰即腸中生癰也。腹中疗痛。其始發熱惡寒。證狀難辨。因下膿血乃覺。或小腹腫滿。或小便澁滯。或膿從臍出。宜吞太乙膏。

瘡毒久不乾成漏者。忍冬草浸酒常服。

瘡毒而大便堅者。升麻和氣飲。和消毒飲。加以身上發熱甚者。消毒飲和敗毒散。

有火邪逼身。及因灸後偏身發爲赤核。腫痛漩盤。用荆防湯浸取洗。

露瘡名爲羊核。生取石菖蒲爛研敷之。仍以石首膠一兩許。火煆存性。研爲末。酒調服。

有不傅藥時大痛。傅即不痛。有不傅藥時不痛。傅之則痛。蓋寒熱風濕并憂怒等氣。積而內攻。則痛不禁。藥拔出之。故不痛也。血死陰毒在中。愈服愈深。愈不覺痛。藥發之於外。故反痛也。

瘡癬疥附丁瘡

此雖皮膚小疾。不足爲害。然瘡有惡瘡。癬有頑癬。疥瘙嗜膚。尤爲煩擾。甚至經年累月。不能脫洒。凡病此者。不當專用外傅藥。須內宣其毒可也。升麻和氣飲。消毒飲。四順清涼飲。犀角飲。皆可用。

有紫白癜風。洒調消風散飲。乾使去浴。即以消風散入皂角末揩洗。外以烏白膏傅之。浴子以醋調貝母末。筆蘸刷之。頻浴頻用爲佳。

瘡名甚多。以其屬外科。不能盡述。

瘡如牛皮模樣。痒甚不可忍者。又疼。用黃連木香黃柏皮杉木節二箇。明礬少許。以上各等分。研末用好眞油調傅。又效。

火帶瘡。遶腰生者。一味剪紅蘿。或花或葉。細末蜜調。傅立效。或小紙貼在上亦可。

丁瘡。近年病此而死者甚多。以其毒氣寇裏。不可以常瘡藥視之。得之倉卒。立至危殆。宜一味雄黃末。酒調多服。外以蒼耳或葉或子。或根或莖。但取一件燒爲灰。醋調如泥。塗上乾卽根出。

痱

痱。素問謂之痱痙。香撲粉入朴硝末。如常撲使。更入少許枯白礬末。

痘疥

自漢已前。方書初無痘疥。至拓拔魏時始有之。膚病初得之。憎寒發熱。身體疼痛。傷寒無異。或有發如瘡者。但鼻冷驗爲痘疥。最忌以藥瀉之。致毒氣攻裏。難起靨子。陳文仲方甚詳。或痘疥出三日四日後。偏身稠密。以成水泡。大便自固。別無所犯。瘡忽盡陷。凹作小孔。如章巨腳。此非病於不發。蓋瘡出既多。血氣尙少。不足以發之。宜以藥滋養其血。血氣旣復。瘡不患不起。宜千金內補散。去防風桔梗。

癩風附下疳瘡

癩風。固精未調。外爲風濕所襲。從陰囊濕汗作痒起。流注四肢手又白色。悉生瘡瘍。俗謂之腎臟風。四生飲二兩。以竹刀細切豬腰一對。銀石器中。酒漉熟爛。研細和藥爲圓。如梧桐子大。如不可圓。入酒醋少許。

每服五六十圓鹽酒空心下。又用花蛇散和消風散。酒調服。或升麻和氣飲。嚥烏頭煮鹽丸。及烏荊丸。或花蛇圓。若癮常濕痒。欲得淋洗。則以蛇床子一味煎湯用之。

下疳瘡用眼藥珍珠粉乾摻。又方用水銀膏貼令水出。卻以火中白煆研末。別煆楓丹等分。和勻入麝香少許摻之。癮風痒不可忍者。薑汁入香油一二滴。攪勻塗之。

擷撲 附刀傷

仆踣不知曰擷。兩下相□曰撲。其爲損一也。因擷撲而迷悶者。酒調蘇合香丸。或雞鳴散。或和氣飲。加大黃入醋少許煎。或童便調黑神散。不用童便。用蘇木煎酒調亦得。擷撲傷疼。酒調琥珀散極佳。再有烏藥順氣散。用以治之。風腰疼尤宜。有擷撲人服藥并薰洗搽藥皆不效自若。或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙乳香沒藥各等分。爲細末。和勻。酒調服之。隨卽痛減其半。

刀傷血不止。一味白勻藥散。白酒調服。卽以散摻傷處。或其血出不透。致惡血壅滯。傷處赤腫。或攻四肢頭面。並雞鳴散。或煎紅花調黑神散。其有血出不止。勢難遏者。用龍骨乳香等分研末。窒患處。蛇魚草搗塞尤妙。非特可治刀傷。撲血不止亦可。

惡蟲蛇傷

爲惡蟲蛇所傷。用白芷細嚼傅患處。仍以酒調芷末服。蜈蚣用雞屎塗。蝮傷用蕨萁芒燒灰。香油調傅。犬傷用虎骨末傅。貓傷用薄荷搗。蜂蠆傷用人參嚼而傅之。或用諸蟹殼燒存性研末。蜜調傅。凡諸惡物傷。

急於傷處灼艾數壯亦佳

發丹

發丹色狀不一。痒痛亦異。大槩皆因血熱肌虛。風邪所搏而發。然色赤者多。以赤故謂之丹。宜消風散。入燒楓樹子存性爲末。酒調服。有發而色白者。謂之冷瘼。宜消風散雜黑神散。酒調。此病多緣肌肉疎。爲風邪所襲而成。風熱則赤。風冷則白。則今人呼赤爲丹。白爲瘼。所以用酒調土硃服之而愈者。亦以脾主肌肉。土能入脾。各從其類。古方一名爲癮疹。非特分寒熱。亦兼備四氣。近世方論呼爲白婆瘼。赤爲血風。赤白二證。並可用烏藥順氣散和消風散。酒調服。白者多用順氣散。赤者多用消風散。病此者俱宜用煎藿香正氣散。有人一生不可食雞肉及獐魚動風等物。纔食則丹隨發。以此見得係是脾風。脾主一身之肌肉。藿香正氣散乃治脾之藥。而土硃亦入脾之藥。此方屢試應驗。

瘰癧

瘰癧之病。皆血氣壅結。根在臟腑。多結於項頸之間。纍纍大小無定。發作寒熱。膿血潰漏。或此沒而彼起。宜於隔宿用米飲調下桂末滑石二錢。重錘動時。進黑白散。必有物如蒲萄肉。從小便出。其數枚於腫核則愈。仍常服四七湯。加木香或蘇子降氣湯。其近頸者。俗名蟠蛇癧。難治。先以石菖蒲爛研。瘡患處。微破。卻以猫狸皮連毛燒灰。香油調傅。一味白斂末。酒調服。多多爲上。仍以酒一呷。搏白斂瘡患處。掘取生者尤好。或用豬膽內水。調雄黃末。傅患處亦好。

癢

癢證不一。疥瘡作痒。當求之本門瘡疥證。血虛皮膚燥痒者。宜四物湯。加防風七錢半。如以四物湯半貼。水二盞。調消風散一錢重亦可。婦人血氣或通身痒。或頭面痒如蟲行皮中。緣月水來時。爲風所吹。不然則是產蓐中食動風物致之。亦宜如前四物湯調消風散。有脾虛身痒。本無疥瘡。素非產蓐。潔然一身痒不可住。此仍脾虛所因。經云。諸痛爲實。諸痒爲虛。又云。脾主身之肌肉。宜實脾爲先。四獸飲去草加藿香厚朴川芎當歸各半錢重。薑棗煎服。名增損資胃飲。

祕傳證治要訣卷之十二

婦人門

經事不調

婦人每月經水應期而下。不使有餘。猶太陰之缺也。其有或先或後。或少或多。或欲來先病。或遇來而斷續。皆謂之不調。和氣飲加香附子半錢。兼嚥獨附丸。經事來而腹痛者。經事不來而腹亦痛者。皆血之不調故也。欲調其血。先調其氣。四物湯加吳茱萸半錢。香附子一錢。和氣飲加茱萸半錢。亦可用。痛甚者玄胡索湯。然又恐感外邪。傷飲食致痛。痛不因血。尤宜詳審。和氣飲卻能兼治。有經事不通。血入四肢化爲水。遂成腫滿。非獨產後爲然。名曰血分。誤作水治。其害不少。宜調經散。因冷而節。因節而痛。宜大溫經湯。冷甚者去麥門冬。有因驚氣上逆。致月不通。涎多神昏。昏則不知人。或妄言歌笑。似心風。似五癎。醒時又似正人。或病來身如搖動。手足如搐搦。四七湯大溫經湯各半貼。和勻服。有經候失期。或過二三月。變生諸證者。和氣飲須用桂枝者。性最動血。和氣飲加蘇木紅花乾漆各半錢。桃仁一錢。或醋或酒煎去查。入麝香少許。仍以醋湯調黑神散。因血節而腹內有塊者。四物湯去地黃加官桂白朮各半錢。

因經候不調。血不循故道。從後糞出。腹或疼或不疼。不可作尋常便血治。宜順其經。四物湯去地黃加阿膠香附子各一錢。仍以黑神散和調氣散。白湯點服。

血疼附血瘧

男子謂之小腸氣。婦人謂之脾血疼。多因血虛後感冷。致血氣凝滯小腸。疼痛牽引腰脇。宿有病根。不關月事通閉。宜和氣飲。或玄胡索湯。失笑散。間進艾附丸。或以鹽一捻。置鐵匙上。火燒研碎。酒調下。異攻散。大便通則愈。若審知血海虛冷而疼。宜小溫經湯。若只瘧不痛。常如肚饑。此乃血虛。胃中枯燥生熱。宜益血藥滋之。可用四物湯。久不治則成消中。

血瘧者。心頭瘧痛。四物湯去地黃。加香附子如數。

血虛

有病後血虛者。有本體血虛者。其人往來寒熱。或五心發熱。言語無力。面色痿黃。頭目昏暈。變生諸疾。芎歸湯加羊肉少許。或十全大補湯。四物湯。養榮湯服之。血虛而氣旺。宜抑氣湯。卽香附末。

血虛而腹疼者。四物湯。

婦人血虛。怒氣用心者。如顛狀。又如心風。或笑歌。或妄語。月事來及產中多有此證。四物湯半貼。去厚朴加人參麥門冬桂芎歸各半錢。名增減四七湯。

崩中

崩有血熱而成者。有氣虛而成者。血大至曰崩中。或清或濁。或純下瘀血。或腐勢不可止。證狀非一。所感亦異。甚則頭目昏暈。四肢厥冷。並宜膠艾湯。噦震靈丹。佐以三灰散。或以童子小便煎理中湯。或以沉香降氣湯加入百草霜。米飲調下。血崩甚而腹痛。人多疑惡血未盡。又見血色瘀黑。愈信惡血之說。不敢止截。大凡血之爲患。欲出未出之際。停在腹內。卽成瘀色。難盡以瘀爲惡。又焉知瘀之不爲虛冷乎。若必待見瘀血之後截之。恐併與人無之矣。此腹痛更有說。積而腹痛。血通而痛止。崩而腹痛。血住則止。止宜芎歸湯加乾姜熟附一錢。止其血而痛自定。仍以剌花綉拭黑片燒灰研末。米飲調下。一方以毛蟹殼燒存性。米飲下。亦有以早黃麻根燒灰爲末。米飲下。

赤白帶

赤白帶下。皆因七情內傷。或下元虛冷。感非一端。大率下白帶多間有下赤者。並宜順氣散。吞震靈丹。仍佐艾附圓。或米飲調沙參末。帶下不止。成氐羸者。四物湯加煅牡蠣粉半錢。吞固陽圓。多服取效。

有帶疾愈後一二月。或再發。半年一發。先血而後下帶。來不可遏。停蓄未幾。又復傾瀉。此名漏帶。最難治。下截之血。小腹主之。有因血虛而虛熱陷入小腸。致小便澁痛。色白如泔。或成沙粒。皆不可作淋治。用冷劑。宜以四物湯五苓飲各半貼和煎。

胎前產後

胎前惡阻。見食嘔吐。喜啖酸物。多臥少起。俗謂之病鬼。蓋其人宿有痰飲。血壅遏而不行。故飲隨氣上。停

滯肝經。肝之味酸。則必喜啖酸物。金尅木。以辛勝之。小半夏茯苓湯。或二陳湯。甚者二陳湯。若嘔吐不食。心虛煩悶。宜橘蘇飲。加竹茹指大。有服熱藥致膈悶熱成疾。宜蒲黃散。荷葉散。轉胞之說。諸論有之。以胎漸長。且近下逼近於胞。胞爲所逼而側。令人數洩。故名轉胞。胞卽膀胱也。然子淋與轉胞相類。但小便頻數點滴而痛爲子淋。頻數出少而不痛爲轉胞。間有微痛。終是與淋不同。並宜生料五苓散。加阿膠一錢。更於胎前諸方求之。五味子八味圓。加當歸亦治轉胞。或更加車前子一味。髮灰湯尤好。

有胎轉胞。用搐鼻藥。多打噴嚏。或用拳打腳心知痛。令病人渾身掇起。則臟腑搖動而胞自反上。

產後諸病。有作寒作熱。而亦有獨熱。然獨熱亦有三。惡血未下者。腹痛而發熱。感外邪者。必有頭痛惡風而發熱。惟血虛卽但發熱而無餘證。名曰虛勞。宜於前血虛證求藥。

產後血虛而煩。蒲黃隔紙炒。東流水調下。產後腹疼。惡血不止。諸藥不效。宜芎歸湯加五味靈脂玄胡索煎。

妊婦子死或不死。胎動決安水酒宜合煎芎歸。未死卽安。已死卽下。戴復菴謂累曾經用。萬不失一。

將產腳赤腫。俗名皺腳。香蘇散加木香一錢。

將產當順氣瘦胎。使臨期易產。宜瘦胎飲。加縮砂少許。

雞產者。用香油半盞。烏醋雞子清并水與香油等打勻。冷進一服。胎衣不下。赤小豆小麥等分煎服。仍以葦麻去殼研七粒。塗兩足心。衣下卽洗去。

產後血入肺面黑發喘宜以參一兩爲末別剉蘇木二兩水二椀煎七分調參末名參蘇飲

產後去血大便不潤而祕宜橘杏圓麻仁圓應失血祕結者皆可用

產後發熱迷悶俗謂之發熱血新瓦上炒荆芥不拘多少半炒半生爲末温熱水調下一錢名獨行散或疑豆淋酒太熱用童便調尤宜若剉散便煎亦得荆芥乃產後要藥角弓反張豆酒調極妙盛怒失喜迷悶不發熱者便調無不效

產後以手摸肚遂痛俗呼爲嫁母痛童便調白芷末破血用歸鬚補血用歸身與頭即是官桂肉攸汗枝發汗之義

四物湯婦人要藥於內加吳茱萸半錢或一錢應血氣病無不治

婦人有一生不破腹而虛者既不破腹何緣有虛大抵婦人以血爲主血衰氣旺定無兒正因血虛所以不育婦人懷子服固胎藥太多或正產或半產胎雖下而惡血不即去或經二三月而惡露猶滴此非敗血之比正緣當來有固經藥在內致血滯而不化藥宜順血通氣不宜蓄血閉氣

彌月俗名滿肚多有恣意食物致傷食發熱有類傷寒食復之證宜先用紅圓子一二服卻進小柴胡湯此論蓋有所本

婦人之藥大率皆甜不利於脾芎歸猶滯況於地黃乎脾胃實者服之固見有功若素有痰飲及有甜入諸血藥中半夏陳皮自不可少

聚寶丹。婦人氣痛血疼。或月經來少作疼。或來多不止而痛。或色瘀。或雜以黃泉。或血敗而加以泄瀉。腹內疼擾。並宜川芎當歸炮薑肉桂各一錢。白水煎服。累用累驗。

角弓反張。乃婦人急候。爲諸病之最。得此者十存一二。荆芥新瓦上微炒末。豆淋酒調下二錢。或只一味獨活爲末。豆淋酒調下。

王雲五主編

叢書集成初編

祕傳證治要訣

中華民國二十六年六月初版

撰述者　戴元禮

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

✽E五三二六

祥